

NUFERTO Amino 011



SKU: SRC-82EDF7505E811228

Danh mục: Axit amin

Công thức: Xác nhận theo lô hiện tại

Quy cách đóng gói: Xác nhận theo lô hiện tại

Giá theo báo giá

[Xem sản phẩm trên website](#)

Mô tả

NUFERTO Amino 011 - Axit amin.

Khi lựa chọn sản phẩm, xem xét đồng thời thành phần, điều kiện sử dụng và nhãn hiệu hành.

Thông tin kỹ thuật

Thành phần bảo đảm	(W/W)
Chất hữu cơ	%46
Axit alginic	%0,8
Axit amin tự do	%8
pH	6-8
Loại bao bì	Can

Tên cây trồng	Giai đoạn sử dụng	Liều phun qua lá
Hồ trăn	Trước ra hoa, khi rụng cánh hoa và khi đậu quả.	250 ml / 100 l nước
Lê	Trước ra hoa, khi rụng cánh hoa, khi đậu quả và khi đường kính quả đạt 6-7 cm.	200 - 300 ml / 100 l nước
Đại mạch	Từ giai đoạn 4-5 lá đến hết đé nhánh, sau đé nhánh sử dụng 2 lần.	300 - 500 ml / da
Hướng dương	Ở giai đoạn 3-4 lá thật và trước ra hoa, sử dụng 2 lần.	300 - 500 ml / da

Tên cây trồng	Giai đoạn sử dụng	Liều phun qua lá
Mộc qua	Trước ra hoa, khi rụng cánh hoa, khi đậu quả và khi đường kính quả đạt 6-7 cm.	200 - 300 ml / 100 l nước
Hạnh nhân	Trước ra hoa, khi rụng cánh hoa và khi đậu quả.	250 ml / 100 l nước
Nho	Trước ra hoa, khi rụng cánh hoa và giai đoạn quả chuyển màu.	250 - 300 ml / 100 l nước
Đậu Hà Lan	Trước ra hoa; sau ra hoa sử dụng 3 lần, cách nhau 10-15 ngày.	200 - 300 ml / 100 l nước
Ớt (Đồng ruộng)	Trước ra hoa, khi đậu quả và trong giai đoạn quả chín.	250 - 300 ml / da
Ớt (Nhà kính)	Trước ra hoa, khi đậu quả và trong giai đoạn quả chín.	250 - 300 ml / 100 l nước
Lúa mì	Từ giai đoạn 4-5 lá đến hết đẻ nhánh, sau đẻ nhánh sử dụng 2 lần.	300 - 500 ml / da
Óc chó	Trước ra hoa, khi rụng cánh hoa và khi đậu quả.	250 ml / 100 l nước
Lúa mạch đen	Từ giai đoạn 4-5 lá đến hết đẻ nhánh, sau đẻ nhánh sử dụng 2 lần.	300 - 500 ml / da
Lúa	Sử dụng 2 lần trong giai đoạn đẻ nhánh và ra hoa.	Lần 1: 400-500 ml / da; lần 2: 500-600 ml / da
Dâu tây (Đồng ruộng)	Trước ra hoa 20-30 ngày, trước đậu quả 3-5 ngày, sau đó mỗi 20 ngày đến hết vụ sản xuất.	200 - 250 ml / da
Dâu tây (Nhà kính)	Trước ngủ đông, đầu sinh trưởng thân lá, trước ra hoa 20-30 ngày, trước đậu quả 3-5 ngày, sau đó mỗi 20 ngày đến hết vụ sản xuất.	200 - 250 ml / 100 l nước
Cà chua (Đồng ruộng)	Trước ra hoa, khi đậu quả và trong giai đoạn quả chín.	250 - 300 ml / da
Cà chua (Nhà kính)	Trước ra hoa, khi đậu quả và trong giai đoạn quả chín.	250 - 300 ml / 100 l nước
Táo	Trước ra hoa, khi rụng cánh hoa, khi đậu quả và khi đường kính quả đạt 6-7 cm.	200 - 300 ml / 100 l nước
Atisô	Bắt đầu sau trồng 3 ngày, sau đó dùng 4 lần, cách nhau 15-20 ngày.	200 - 300 ml / 100 l nước

Tên cây trồng	Giai đoạn sử dụng	Liều phun qua lá
Mận	Trước ra hoa, khi rụng cánh hoa, khi đậu quả và khi đường kính quả đạt 6-7 cm.	200 - 250 ml / 100 l nước
Đậu cô ve	Trước ra hoa; sau ra hoa sử dụng 3 lần, cách nhau 10-15 ngày.	300 ml / 100 l nước
Phỉ	Trước ra hoa, khi rụng cánh hoa và khi đậu quả.	250 ml / 100 l nước
Bưởi chùm	Trong sinh trưởng thân lá và trước ra hoa, khi rụng cánh hoa, đậu quả và khi đường kính quả đạt 6-7 cm.	200 - 300 ml / 100 l nước
Cà rốt	Khi rễ to bằng bút chì, sử dụng 3-4 lần, cách nhau 2-3 tuần.	300 - 400 ml / da
Dưa chuột (Đồng ruộng)	Trước ra hoa, khi đậu quả và trong giai đoạn quả chín.	300 ml / da
Dưa chuột (Nhà kính)	Trước ra hoa, khi đậu quả và trong giai đoạn quả chín.	100 - 250 ml / 100 l nước
Rau bina	Bắt đầu sau gieo 15-20 ngày, sau đó sử dụng mỗi 20 ngày.	250 ml / da
Bí (Đồng ruộng)	Ở giai đoạn 4-5 lá, trước ra hoa, khi đậu quả và quả chín.	300 ml / da
Bí (Nhà kính)	Ở giai đoạn 4-5 lá, trước ra hoa, khi đậu quả và quả chín.	100 - 250 ml / 100 l nước
Dưa hấu (Đồng ruộng)	Ở giai đoạn 4-5 lá, trước ra hoa, khi đậu quả và quả chín.	300 ml / da
Dưa hấu (Nhà kính)	Ở giai đoạn 4-5 lá, trước ra hoa, khi đậu quả và quả chín.	100 - 250 ml / 100 l nước
Dưa lưới (Đồng ruộng)	Ở giai đoạn 4-5 lá, trước ra hoa, khi đậu quả và quả chín.	300 ml / da
Dưa lưới (Nhà kính)	Ở giai đoạn 4-5 lá, trước ra hoa, khi đậu quả và quả chín.	100 - 250 ml / 100 l nước
Mơ	Trước ra hoa, khi rụng cánh hoa, khi đậu quả và khi đường kính quả đạt 6-7 cm.	200 - 250 ml / 100 l nước
Cần tây	Bắt đầu sau trồng 10-15 ngày, sau đó dùng mỗi 20 ngày.	250 ml / da
Dẻ	Trước ra hoa, khi rụng cánh hoa và khi đậu quả.	250 ml / 100 l nước

Tên cây trồng	Giai đoạn sử dụng	Liều phun qua lá
Anh đào ngọt	Trước ra hoa, khi rụng cánh hoa, khi đậu quả và khi đường kính quả đạt 6-7 cm.	200 - 250 ml / 100 l nước
Kiwi	Trong sinh trưởng thân lá và trước ra hoa, khi rụng cánh hoa, đậu quả và khi đường kính quả đạt 6-7 cm.	150 - 200 ml / 100 l nước 250 - 300 ml / 100 l nước
Cải dầu	Sử dụng 2 lần trong giai đoạn hình thành cành bên và vươn thân.	200 ml / da
Rau họ cải	Sử dụng hai lần sau trồng, cách nhau 20 ngày.	250 - 300 ml / da
Chanh vàng	Trong sinh trưởng thân lá và trước ra hoa, khi rụng cánh hoa, đậu quả và khi đường kính quả đạt 6-7 cm.	200 - 300 ml / 100 l nước
Quýt	Trong sinh trưởng thân lá và trước ra hoa, khi rụng cánh hoa, đậu quả và khi đường kính quả đạt 6-7 cm.	200 - 300 ml / 100 l nước
Xà lách (Đồng ruộng)	Bắt đầu sau cấy 10-15 ngày, sau đó dùng mỗi 20 ngày.	250 ml / da
Xà lách (Nhà kính)	Bắt đầu sau cấy 10-15 ngày, sau đó dùng mỗi 20 ngày.	250 ml / 100 l nước
Mùi tây	Khi rễ to bằng bút chì, sử dụng 3-4 lần, cách nhau 2-3 tuần.	250 - 300 ml / da
Đậu lăng	Bắt đầu sau gieo 25 ngày; dùng 3 lần, cách nhau 15 ngày.	250 - 300 ml / da
Ngô	Bắt đầu sau gieo 25 ngày; dùng 3 lần, cách nhau 15 ngày.	250 - 300 ml / da
Chuối	Trong giai đoạn quan trọng như ra hoa, rụng và hình thành quả, chuyển màu hoặc rét đóng băng, dùng 2-4 lần, cách nhau 12-14 ngày. Dùng liều thấp cho cây non 1-2 năm tuổi.	250 - 350 ml / da
Lựu	Trước ra hoa, khi rụng cánh hoa, khi đậu quả và khi đường kính quả đạt 6-7 cm.	200 - 250 ml / 100 l nước
Đào trơn	Trước ra hoa, khi rụng cánh hoa, khi đậu quả và khi đường kính quả đạt 6-7 cm.	200 - 250 ml / 100 l nước
Đậu gà	Bắt đầu sau gieo 25 ngày; dùng 3 lần, cách nhau 15 ngày.	250 - 300 ml / da

Tên cây trồng	Giai đoạn sử dụng	Liều phun qua lá
Bông	Ở giai đoạn 3-4 lá, trước và sau ra hoa, dùng 3 lần.	200 - 300 ml / da
Khoai tây	Khi cây đạt 15 cm, khi củ bằng hạt phỉ và sau đó 15 ngày.	200 - 300 ml / da
Cà tím (Đồng ruộng)	Trước ra hoa, khi đậu quả và trong giai đoạn quả chín.	250 - 300 ml / da
Cà tím (Nhà kính)	Trước ra hoa, khi đậu quả và trong giai đoạn quả chín.	250 - 300 ml / 100 l nước
Tỏi tây	Bắt đầu sau trồng 10-15 ngày, sau đó dùng mỗi 20 ngày.	250 ml / da
Cam	Trong sinh trưởng thân lá và trước ra hoa, khi rụng cánh hoa, đậu quả và khi đường kính quả đạt 6-7 cm.	200 - 300 ml / 100 l nước
Tỏi	Sau khi bắt đầu hình thành củ, dùng mỗi 20 ngày; có thể pha chung bốn với hợp chất chứa đồng.	200 - 300 ml / da
Hành tây	Sau khi bắt đầu hình thành củ, dùng mỗi 20 ngày; có thể pha chung bốn với hợp chất chứa đồng.	200 - 300 ml / da
Đậu tương	Bắt đầu sau gieo 25 ngày; dùng 3 lần, cách nhau 15 ngày.	250 - 300 ml / da
Đào	Trước ra hoa, khi rụng cánh hoa, khi đậu quả và khi đường kính quả đạt 6-7 cm.	200 - 250 ml / 100 l nước
Củ cải đường	Bắt đầu sau gieo 15-20 ngày, sau đó sử dụng mỗi 20 ngày.	250 ml / da
Thuốc lá	Bắt đầu sau trồng cây con 20 ngày, sau đó dùng 3 lần, cách nhau 15 ngày.	200 - 250 ml / da
Anh đào chua	Trước ra hoa, khi rụng cánh hoa, khi đậu quả và khi đường kính quả đạt 6-7 cm.	200 - 250 ml / 100 l nước
Lạc	Bắt đầu sau gieo 25 ngày; dùng 3 lần, cách nhau 15 ngày.	250 - 300 ml / da
Yến mạch	Từ giai đoạn 4-5 lá đến hết đẻ nhánh, sau đẻ nhánh sử dụng 2 lần.	300 - 500 ml / da

Tình trạng sẵn có, bao bì, giá và thông số lô hàng được xác nhận trong báo giá. Tuân theo nhãn và hướng dẫn hiện hành. Hình ảnh bao bì mang tính minh họa.

Liên hệ và đặt hàng

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727