

NUFERTO Amino 015



SKU: SRC-EEC1980D45D498A4

Kategoria: Aminokwasy

Formuła: Potwierdź dla aktualnej partii

Opakowanie: Potwierdź dla aktualnej partii

Cena na zapytanie

[Zobacz produkt online](#)

Opis

NUFERTO Amino 015 - Aminokwasy.

Przy wyborze produktu uwzględnij łącznie skład, warunki stosowania i aktualną etykietę.

Informacje techniczne

Gwarantowany skład	(W/W)
Materia organiczna	%35
Węgiel organiczny	%17
Azot organiczny (N)	%2
Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	%2,5
Wolne aminokwasy	%6
pH	3,3 - 5,3
Rodzaj opakowania	Kanister

Produkt	Sposób stosowania	Dawka stosowania	Termin stosowania	
Warzywa	Pomidor, Papryka, Bakłażan,	Dolistnie	400 - 500 cc/100 lt	Pierwszy zabieg wykonać 2 tygodni po sadzeniu i kontynuować do 10 dni przed zbiorem.
Ogórek, Cukinia itp.	Doglebowo	3 - 5 kg/da	Stosować co 7-15 dni od sadzenia do końca zbiorów.	

Produkt	Sposób stosowania	Dawka stosowania	Termin stosowania	
Salata, Kapustowate, Rukola, Rzeżucha, Pietruszka itp.	Dolistnie	300 - 400 cc/100 lt	Rozpocząć 1 tygodni po sadzeniu, następnie powtórzyć 4-5 razy, do 10 dni przed końcem zbiorów.	
Doglebowo	2 - 4 kg/da	Rozpocząć 1 tygodni po sadzeniu, następnie stosować co 10-15 dni do zbioru.		
Drzewa owocowe	Cytrusy (Cytryna, Grejpfrut, Pomarańcza, Mandarynka, Gorzka pomarańcza, Bergamotka itp.)	Dolistnie	400 cc/100 lt	Stosować od zawiązania owoców do osiągnięcia przez nie 80-90% normalnej wielkości.
Doglebowo	15 - 20 kg/da	Rozpocząć przy wyrastaniu pędów i nabrzmiewaniu pąków kwiatowych, następnie kontynuować do zbioru.		
Jabłko, Gruszka, Orzech laskowy, Czereśnia, Wiśnia, Śliwka, Brzoskwinia, Morela, Pigwa, Granat, Truskawka, Oliwka itp.	Dolistnie	300 cc/100 lt	Stosować od początku rozwoju liści do 15-20 dni przed zbiorem.	
Doglebowo	25 kg/da	Rozpocząć przy pierwszym nawadnianiu, następnie stosować co 15-20 dni do zbioru.		
Uprawy polowe	Zboża, Rośliny pastewne, Rośliny lecznicze i aromatyczne, Rośliny przemysłowe, Melon, Arbuz itp.	Dolistnie	1 kg/da	Można mieszać z herbicydem. W okresie uprawy można wykonać 2 zabiegów.
Rośliny ozdobne	Kwiaty cięte, Rośliny pokojowe	Dolistnie	200 - 250 cc/100 lt	Kontynuować stosowanie w okresie uprawy do 20 dni przed zbiorem.

Produkt	Sposób stosowania	Dawka stosowania	Termin stosowania	
Doglebowo	3 - 4 kg/da	Stosować raz w tygodniu przez cały okres uprawy.		
Trawniki i tereny zielone	Deszczowanie	1 - 3 kg/da	Stosować przez cały okres uprawy.	
Winorośl	Winogrona deserowe, Winogrona na rodzynki, Winogrona winiarskie	Dolistnie	400 cc/100 lt	Stosować od początku rozwoju liści do końca fazy zielonych jagód.
Doglebowo	15 kg/da	Stosować w wybranych odstępach od początku rozwoju liści do końca zbiorów.		
Banan	Uprawa szklarniowa i Uprawa w gruncie.	Doglebowo	15 - 20 kg/da	Stosować raz w tygodniu przez cały okres uprawy.

Dostępność, opakowanie, ceny i parametry partii są potwierdzane w ofercie. Stosuj aktualną etykietę i instrukcję. Grafiki opakowań mają charakter poglądowy.

Kontakt i zamówienia

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727