

NUFERTO NPK 049



SKU: SRC-7CD1BCDD9FD8692E

Categoria: Concimi composti

Formula: Da confermare per il lotto attuale

Confezionamento: Da confermare per il lotto attuale

Prezzo su richiesta

[Visualizza il prodotto online](#)

Descrizione

NUFERTO NPK 049 - Concimi composti.

Quando scegli un prodotto, valuta insieme composizione, condizioni d'impiego ed etichetta attuale.

Informazioni tecniche

Composizione garantita	(W/W)
Sostanza organica	%25
Azoto totale (N)	%4
Azoto nitrico (N)	%1,2
Azoto ammoniacale (N)	%0,8
Azoto ureico (N)	%1
Azoto organico (N)	%1
Ossido di potassio solubile in acqua (K2O)	%6
Ferro solubile in acqua (Fe)	%2
Manganese solubile in acqua (Mn)	%1
Cloruri, massimo (Cl)	%1
pH	2,2 - 4,2
Tipo di confezione	Tanica

Prodotto	Modalità d'impiego	Dose d'impiego	Epoca d'impiego	
Ortaggi	Pomodoro, Peperone,	Per via fogliare	250 - 300 cc/100 lt	Effettuare la prima

Prodotto	Modalità d'impiego	Dose d'impiego	Epoca d'impiego	
	Melanzana, Cetriolo, Zucchini ecc.			applicazione 2 settimane dopo il trapianto e proseguire fino a 10 giorni prima della raccolta.
Al suolo	2 - 4 kg/da	Applicare ogni 7-15 giorni dal trapianto fino al termine della raccolta.		
Lattuga, Brassicacee, Rucola, Crescione, Prezzemolo ecc.	Per via fogliare	300 cc/100 lt	Iniziare 1 settimana dopo il trapianto, poi ripetere 4-5 volte fino a 10 giorni prima del termine della raccolta.	
Al suolo	1 - 3 kg/da	Iniziare 1 settimana dopo il trapianto, poi applicare ogni 10-15 giorni fino alla raccolta.		
Alberi da frutto	Agrumi (Limone, Pompelmo, Arancia, Mandarino, Arancio amaro, Bergamotto ecc.)	Per via fogliare	250 - 300 cc/100 lt	Applicare dall'allegagione fino a quando i frutti raggiungono il 80-90% della dimensione normale.
Al suolo	10 - 15 kg/da	Iniziare all'emissione dei germogli e al rigonfiamento delle gemme a fiore, poi proseguire fino alla raccolta.		
Mela, Pera, Nocciola, Ciliegia, Amarena, Prugna, Pesca, Albicocca, Cotogno, Melograno, Fragola, Olivo ecc.	Per via fogliare	300 cc/100 lt	Applicare dall'inizio della fogliazione fino a 15-20 giorni prima della raccolta.	
Al suolo	25 kg/da	Iniziare con la prima irrigazione, poi applicare ogni 15-20 giorni fino alla raccolta.		

Prodotto	Modalità d'impiego	Dose d'impiego	Epoca d'impiego	
Colture da pieno campo	Cereali, Colture foraggere, Pianta officinali e aromatiche, Colture industriali, Melone, Anguria ecc.	Per via fogliare	1 - 3 kg/da	Può essere miscelato con un erbicida. Sono possibili 2 applicazioni nel periodo di coltivazione.
Piante ornamentali	Fiori recisi, Pianta da interno	Per via fogliare	200 - 250 cc/100 lt	Proseguire durante la coltivazione fino a 20 giorni prima della raccolta.
Al suolo	2 - 4 kg/da	Applicare una volta alla settimana durante tutto il periodo di coltivazione.		
Tappeti erbosi e aree verdi	Irrigazione a pioggia	1 - 3 kg/da	Applicare durante tutto il periodo di coltivazione.	
Vite	Uva da tavola, Uva da essiccazione, Uva da vino	Per via fogliare	300 cc/100 lt	Applicare dall'inizio della fogliazione fino al termine dello stadio di acini verdi.
Al suolo	25 kg/da	Applicare agli intervalli desiderati dall'inizio della fogliazione fino al termine della raccolta.		
Banano	Coltivazione in serra e Coltivazione in pieno campo.	Al suolo	10 - 15 kg/da	Applicare una volta alla settimana durante tutto il periodo di coltivazione.

Disponibilità, confezionamento, prezzi e specifiche del lotto sono confermati nel preventivo. Seguire l'etichetta e le istruzioni aggiornate. Le immagini delle confezioni sono illustrative.

Contatti e ordini

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727