

NUFERTO Potash 006



SKU: SRC-795980C65B70FE79

Catégorie: Engrais potassiques

Formule: À confirmer pour le lot actuel

Conditionnement: À confirmer pour le lot actuel

Prix sur demande

[Consulter le produit en ligne](#)

Description

NUFERTO Potash 006 - Engrais potassiques.

Pour choisir un produit, examinez ensemble sa composition, les conditions d'application et l'étiquette actuelle.

Informations techniques

Composition garantie	(W/W)
Matière organique	%40
Carbone organique	%20
Azote total (N)	%2
Oxyde de potassium soluble dans l'eau (K2O)	%4
pH	4,6 - 6,6
Type d'emballage	25 KG Bidon

Produit	Mode d'application	Dose d'application	Période d'application	
Pour la germination des graines		Au sol	200 - 400 cc/10 lt	Peut être apporté avec l'eau d'irrigation à tout moment avant et pendant le stade plantule.
Produit	Mode d'application	Dose d'application	Période d'application	
Légumes	Tomate, Poivron, Aubergine, Concombre, Courgette, Laitue,	Au sol	2 - 5 kg/da (par semaine)	La première application peut accompagner l'arrosage de reprise

Produit	Mode d'application	Dose d'application	Période d'application	
	Cresson alénois, Brassicacées, Roquette, Melon, Persil, Pastèque, etc.			après plantation. Poursuivre jusqu'à la récolte en augmentant la dose selon le développement de la plante.
Arbres fruitiers	Pomme, Poire, Cerise douce, Cerise acide, Prune, Pêche, Abricot, Coing, Grenade, Fraise, Agrumes, Noisette, Thé, Olivier etc.	Au sol	25 kg/da	Commencer avec la première irrigation et poursuivre jusqu'à la récolte. Convient à l'aspersion, au goutte à goutte et à l'irrigation par submersion.
Grandes cultures	Céréales, Cultures fourragères, Plantes médicinales et aromatiques, Cultures industrielles, Melon, Pastèque etc.	Au sol	8 - 10 kg/da (3 - 4 applications)	Peut être apporté à chaque irrigation. En aspersion, faire suivre l'application de 10 à 15 minutes d'eau claire.
Fleurs coupées, Plantes pour compositions florales	Œillet, Rose, Gerbera, Cactus, Tulipe, Narcisse, Jacinthe, Freesia, Marguerite etc.	Au sol	2 - 4 kg/da	Appliquer une fois par semaine pendant la culture, en adaptant la dose à l'état de croissance.
Gazons, parcs et jardins	Gazons et espaces verts, Terrains de golf, etc.	Au sol (Aspersion)	8 - 10 kg/da	Appliquer tous les 10 à 15 jours pendant la culture. Avec un système d'aspersion, distribuer de l'eau claire pendant les 10 à 15 dernières minutes.
Vigne	Raisin de table, Raisin destiné au séchage, Raisin de cuve	Au sol	10 kg/da (à intervalles de 15 jours)	Peut être appliqué pendant toute la culture. Augmenter la dose au stade des baies vertes.
Bananier	Culture sous serre et Culture en plein champ	Au sol	10 kg/da (à intervalles de 15 jours)	Appliquer une fois par semaine pendant la croissance du bananier ; augmenter progressivement la dose de la sortie du régime jusqu'à la récolte.

Disponibilité, conditionnement, prix et caractéristiques du lot sont confirmés dans le devis. Suivez l'étiquette et les instructions actuelles. Les visuels d'emballage sont illustratifs.

Contact et commandes

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727