

NUFERTO Nitro 002



SKU: SRC-943D7F7D36626566

Catégorie: Engrais azotés

Formule: À confirmer pour le lot actuel

Conditionnement: À confirmer pour le lot actuel

Prix sur demande

[Consulter le produit en ligne](#)

Description

NUFERTO Nitro 002 - Engrais azotés.

Pour choisir un produit, examinez ensemble sa composition, les conditions d'application et l'étiquette actuelle.

Informations techniques

Composition garantie	(W/W)
Matière organique	%30
Azote total (N)	%10
Azote nitrique (N)	%2,7
Azote ammoniacal (N)	%1,5
Azote uréique (N)	%3,8
Azote organique (N)	%2
Oxyde de calcium soluble dans l'eau (CaO)	%2
Oxyde de magnésium soluble dans l'eau (MgO)	%2
Chlorures, maximum (Cl)	%0,5
pH	2,4 - 4,4
Type d'emballage	Bidon

Produit	Mode d'application	Dose d'application	Période d'application	
Légumes	Tomate, Poivron, Aubergine,	Par voie foliaire	400 - 500 cc/100 lt	Effectuer la première application 2

Produit	Mode d'application	Dose d'application	Période d'application	
	Concombre, Courgette etc.			semaines après plantation et poursuivre jusqu'à 10 jours avant la récolte.
Au sol	3 - 5 kg/da	Appliquer tous les 7 à 15 jours depuis la plantation jusqu'à la fin de la récolte.		
Laitue, Brassicacées, Roquette, Cresson alénois, Persil etc.	Par voie foliaire	300 - 400 cc/100 lt	Commencer 1 semaines après plantation, puis renouveler 4 à 5 fois jusqu'à 10 jours avant la fin de la récolte.	
Au sol	2 - 4 kg/da	Commencer 1 semaines après plantation, puis appliquer tous les 10 à 15 jours jusqu'à la récolte.		
Arbres fruitiers	Agrumes (Citron, Pamplemousse, Orange, Mandarine, Orange amère, Bergamote etc.)	Par voie foliaire	400 cc/100 lt	Appliquer de la nouaison jusqu'à ce que les fruits atteignent 80 à 90 % de leur taille normale.
Au sol	25 kg/da	Commencer dès l'émission des pousses et le gonflement des bourgeons floraux, puis poursuivre jusqu'à la récolte.		
Pomme, Poire, Noisette, Cerise douce, Cerise acide, Prune, Pêche, Abricot, Coing, Grenade, Fraise, Olivier etc.	Par voie foliaire	300 cc/100 lt	Appliquer depuis le début de la feuillaison jusqu'à 15 à 20 jours avant la récolte.	
Au sol	25 kg/da	Commencer avec la première irrigation, puis appliquer tous les 15 à 20 jours jusqu'à la récolte.		

Produit	Mode d'application	Dose d'application	Période d'application	
Grandes cultures	Céréales, Cultures fourragères, Plantes médicinales et aromatiques, Cultures industrielles etc.	Par voie foliaire	1 - 3 kg/da	Peut être mélangé à un herbicide. 2 applications peuvent être effectuées pendant la période de culture.
Par voie foliaire	200 - 250 cc/100 lt	Poursuivre l'application pendant la culture jusqu'à 20 jours avant la récolte.		
Gazons et espaces verts	Au sol	10 - 15 kg/da	Appliquer une fois par semaine pendant toute la période de culture.	
Aspersion	1 - 3 kg/da	Appliquer pendant toute la période de culture.		
Vigne	Raisin de table, Raisin destiné au séchage, Raisin de cuve	Par voie foliaire	400 cc/100 lt	Appliquer du début de la feuillaison jusqu'à la fin du stade des baies vertes.
Au sol	25 kg/da	Appliquer à la fréquence souhaitée depuis le début de la feuillaison jusqu'à la fin de la récolte.		
Bananier	Culture sous serre et Culture en plein champ.	Au sol	10 kg/da	Appliquer une fois par semaine pendant toute la période de culture.

Disponibilité, conditionnement, prix et caractéristiques du lot sont confirmés dans le devis. Suivez l'étiquette et les instructions actuelles. Les visuels d'emballage sont illustratifs.

Contact et commandes

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727