

NUFERTO Alga 003



SKU: SRC-BD645D06B2DA7E83

Catégorie: Extraits d'algues marines

Formule: À confirmer pour le lot actuel

Conditionnement: À confirmer pour le lot actuel

Prix sur demande

[Consulter le produit en ligne](#)

Description

NUFERTO Alga 003 - Extraits d'algues marines.

Pour choisir un produit, examinez ensemble sa composition, les conditions d'application et l'étiquette actuelle.

Informations techniques

Composition garantie	% W/W
Matière organique totale:	25
Oxyde de potassium soluble dans l'eau (K2O):	6
Acide alginique:	0,6
Acide gibbérellique:	10 ppm
CE maximale (dS/m):	21
pH:	8-10

Cultures	Période d'application	Par goutte à goutte ou aspersion	Par voie foliaire (Avec 100 lt d'eau)
Tomate, Poivron, Aubergine, Concombre, Courgette, Haricot, Pois etc.	Effectuer 1 applications pendant les premiers stades, jusqu'à la fleur numéro 2 ; puis 2-3 applications de la fleur numéro 2 jusqu'à la récolte.	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Cultures	Période d'application	Par goutte à goutte ou aspersion	Par voie foliaire (Avec 100 lt d'eau)
Persil, Laitue, Épinard,	*Au stade 4-6 feuilles, *2-3	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc

Cultures	Période d'application	Par goutte à goutte ou aspersion	Par voie foliaire (Avec 100 lt d'eau)
Chou, Chou-fleur, Artichaut, Carotte, Oignon, Ail, Poireau, Betterave	semaines après la première application		
Pomme de terre	Effectuer 1 applications pendant les premiers stades, jusqu'à la fleur numéro 2 ; puis 2-3 applications de la deuxième fleur jusqu'à la récolte.	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Agrumes: Orange, Citron, Mandarine, Pamplemousse etc.	Une application avant floraison, après la formation des fruits et au stade de la taille d'une noix.	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
*Fruits à noyau et à pépins: Pomme, Poire, Abricot, Pêche, Prune, Cerise douce, Grenade, Kiwi, Olivier, Pistachier, Amandier, Noisette, Noyer	*Application 1: Après floraison, *Application 2: 2-3 semaines après la première application	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
Vigne	1. Lorsque les pousses atteignent 15-20 cm. 2. Avant floraison. 3. Au stade des petites baies vertes. 4. Pendant la croissance des fruits, avant le début de l'accumulation des sucres.	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
Fraise, Framboise	Application 1 : Avant floraison 2. Après la première application À intervalles de 15 jours 2 fois	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Bananier	Appliquer immédiatement après les travaux d'entretien de la bananeraie et avant la sortie du régime	1,5 - 2 lt. / da.	300 cc
Cotonnier, Soja, Arachide, Maïs, Lentille, Pois chiche, Tournesol	Tous les 15 jours, dès la formation de 3-5 feuilles jusqu'à la récolte	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Tabac, Thé	Application 1 : Après binage 2. Après la première cueillette des feuilles de tabac	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc

Cultures	Période d'application	Par goutte à goutte ou aspersion	Par voie foliaire (Avec 100 lt d'eau)
Betterave sucrière	Application 1 : Au début de la croissance racinaire 2.Au début de l'accumulation des sucres 3.1,5 mois avant récolte	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc
Fleurs coupées, Espaces verts	3-4 applications espacées de 10-15 jours dès le développement des feuilles	1-1,5 lt./da	200 cc
Blé, Orge, Riz, Avoine, Colza canola	Effectuer 2 applications au tallage et 15 jours plus tard.	1,5 - 2 lt. / da.	200 cc

Disponibilité, conditionnement, prix et caractéristiques du lot sont confirmés dans le devis. Suivez l'étiquette et les instructions actuelles. Les visuels d'emballage sont illustratifs.

Contact et commandes

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727