

NUFERTO Nutrient 069



SKU: SRC-5452F86CBCE35692

Catégorie: Autres produits de nutrition végétale

Formule: À confirmer pour le lot actuel

Conditionnement: À confirmer pour le lot actuel

Prix sur demande

[Consulter le produit en ligne](#)

Description

NUFERTO Nutrient 069 - Autres produits de nutrition végétale.

Pour choisir un produit, examinez ensemble sa composition, les conditions d'application et l'étiquette actuelle.

Informations techniques

Composition garantie	% W/W
Matière organique totale:	24
Carbone organique:	9
Azote total (N):	1
Oxyde de potassium soluble dans l'eau (K2O):	1
Plage de pH:	4-6

Cultures	Période d'application	Application foliaire	Au sol (Irrigation goutte à goutte)
Toutes les cultures : Maraîchage sous serre (Tomate, Poivron, Aubergine, Concombre, Haricot, Fraise, Banancier, etc.)	Application foliaire : commencer 20 jours après plantation, puis renouveler tous les 10 jours jusqu'à la fin de la récolte. Goutte à goutte : application 1 pendant l'enracinement, 10-15 jours après plantation ; application 2 à mi-saison.	200-250 cc/100 lt d'eau	1 - 1,5 lt /da.

Cultures	Période d'application	Application foliaire	Au sol (Irrigation goutte à goutte)
Toutes les cultures : Maraîchage de plein champ (Tomate, Poivron, Aubergine, Concombre, Haricot, Thé, Fraise, etc.)	Par voie foliaire: 20 jours après plantation À intervalles de 10 jours Appliquer jusqu'à la fin de la récolte.	200-250 cc/100 lt d'eau	1,5 - 2 lt /da.
Toutes les cultures : Légumes-feuilles (Chou-fleur, Poireau, Épinard, Laitue, Laitue frisée, Laitue iceberg, etc.)	Application foliaire : commencer 20 jours après plantation, puis renouveler tous les 10 jours jusqu'à la fin de la récolte. Goutte à goutte : application 1 pendant l'enracinement, 10-15 jours après plantation ; application 2 à mi-saison.	200-250 cc/100 lt d'eau	1 - 1,5 lt /da.
Melon, Pastèque, Courgette, Radis, Oignon, Carotte, Pomme de terre etc.	Application foliaire : commencer 20 jours après plantation, puis renouveler tous les 10 jours jusqu'à la fin de la récolte. Goutte à goutte : application 1 pendant l'enracinement, 10-15 jours après plantation ; application 2 à mi-saison.	200-250 cc/100 lt d'eau	1 - 1,5 lt /da.
Arbres fruitiers (Pomme, Poire, Pêche, Abricot, Coing, Cerise douce, Cerise acide, Vigne, Olivier, Agrumes, etc.)	Trois applications sont recommandées. 1. Juste avant le bourgeonnement et la floraison 2. À la formation des fruits 3. Jusqu'à la fin de la récolte	200-250 cc/100 lt d'eau	2 - 2,5 lt /da. ou Par arbre 100 cc/100 lt d'eau / arbre
Pistachier, Noisetier, Amandier, Noyer	Effectuer 2 applications espacées de 15 jours dès la plantation.	200-250 cc/100 lt d'eau	2 - 2,5 lt /da.
Toutes les cultures : Grandes cultures (Blé, Orge, Riz, Pois chiche, Lentille, etc.)	Effectuer deux applications; Application 1: Avec les herbicides Application 2: Pendant le tallage	200-250 cc/100 lt d'eau	1 lt /da.
Toutes les cultures : Cultures industrielles (Betterave sucrière, Arachide, Maïs, Soja, Tabac, Cotonnier, Tournesol, etc.)	Lorsque les plantes atteignent 5-10 cm, effectuer 2 applications espacées de 20 jours.	200-250 cc/100 lt d'eau	2 - 2,5 lt /da.
Fleurs coupées, Espaces verts	Effectuer 2 applications espacées de 15 jours, de la plantation jusqu'à la fin de la récolte.	200-250 cc/100 lt d'eau	2 - 2,5 lt /da.

Disponibilité, conditionnement, prix et caractéristiques du lot sont confirmés dans le devis. Suivez l'étiquette et les instructions actuelles. Les visuels d'emballage sont illustratifs.

Contact et commandes

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727