

NUFERTO Nutrient 069



SKU: SRC-5452F86CBCE35692

Categoria: Altri prodotti per la nutrizione vegetale

Formula: Da confermare per il lotto attuale

Confezionamento: Da confermare per il lotto attuale

Prezzo su richiesta

[Visualizza il prodotto online](#)

Descrizione

NUFERTO Nutrient 069 - Altri prodotti per la nutrizione vegetale.

Quando scegli un prodotto, valuta insieme composizione, condizioni d'impiego ed etichetta attuale.

Informazioni tecniche

Composizione garantita	% W/W
Sostanza organica totale:	24
Carbonio organico:	9
Azoto totale (N):	1
Ossido di potassio solubile in acqua (K2O):	1
Intervallo di pH:	4-6

Culture	Epoca d'impiego	Applicazione fogliare	Al suolo (Irrigazione a goccia)
Tutte le colture: Orticoltura in serra (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Fagiolo, Fragola, Banano, ecc.)	Per via fogliare: iniziare 20 giorni dopo il trapianto, poi ripetere ogni 10 giorni fino alla fine della raccolta. A goccia: applicazione 1 durante la radicazione, 10-15 giorni dopo il trapianto; applicazione 2 a metà stagione.	200-250 cc/100 lt acqua	1 - 1,5 lt /da.

Culture	Epoca d'impiego	Applicazione fogliare	Al suolo (Irrigazione a goccia)
Tutte le colture: Orticoltura	Per via fogliare: 20 giorni	200-250 cc/100 lt acqua	1,5 - 2 lt /da.

Colture	Epoca d'impiego	Applicazione fogliare	Al suolo (Irrigazione a goccia)
in pieno campo (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Fagiolo, Tè, Fragola, ecc.)	dopo il trapianto A intervalli di 10 giorni Applicare fino alla fine della raccolta.		
Tutte le colture: Ortaggi da foglia (Cavolfiore, Porro, Spinacio, Lattuga, Lattuga riccia, Lattuga iceberg, ecc.)	Per via fogliare: iniziare 20 giorni dopo il trapianto, poi ripetere ogni 10 giorni fino alla fine della raccolta. A goccia: applicazione 1 durante la radicazione, 10-15 giorni dopo il trapianto; applicazione 2 a metà stagione.	200-250 cc/100 lt acqua	1 - 1,5 lt /da.
Melone, Anguria, Zucchini, Ravanello, Cipolla, Carota, Patata ecc.	Per via fogliare: iniziare 20 giorni dopo il trapianto, poi ripetere ogni 10 giorni fino alla fine della raccolta. A goccia: applicazione 1 durante la radicazione, 10-15 giorni dopo il trapianto; applicazione 2 a metà stagione.	200-250 cc/100 lt acqua	1 - 1,5 lt /da.
Alberi da frutto (Mela, Pera, Pesca, Albicocca, Cotogno, Ciliegia, Amarena, Vite, Olivo, Agrumi, ecc.)	Si consigliano tre applicazioni. 1.Subito prima della formazione dei boccioli e della fioritura 2.Alla formazione dei frutti 3.Fino alla fine della raccolta	200-250 cc/100 lt acqua	2 - 2,5 lt /da. o Per albero 100 cc/100 lt acqua / albero
Pistacchio, Nocciola, Mandorlo, Noce	Eseguire 2 applicazioni ogni 15 giorni dal trapianto.	200-250 cc/100 lt acqua	2 - 2,5 lt /da.
Tutte le colture: Colture da pieno campo (Frumento, Orzo, Riso, Cece, Lenticchia, ecc.)	Eseguire due applicazioni; Applicazione 1: Insieme agli erbicidi Applicazione 2: Durante l'accestimento	200-250 cc/100 lt acqua	1 lt /da.
Tutte le colture: Colture industriali (Barbabietola da zucchero, Arachide, Mais, Soia, Tabacco, Cotone, Girasole, ecc.)	Quando le piante raggiungono 5-10 cm, eseguire 2 applicazioni ogni 20 giorni.	200-250 cc/100 lt acqua	2 - 2,5 lt /da.
Fiori recisi, Aree verdi	Eseguire 2 applicazioni ogni 15 giorni, dal trapianto fino alla fine della raccolta.	200-250 cc/100 lt acqua	2 - 2,5 lt /da.

Disponibilità, confezionamento, prezzi e specifiche del lotto sono confermati nel preventivo. Seguire l'etichetta e le

istruzioni aggiornate. Le immagini delle confezioni sono illustrative.

Contatti e ordini

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727