

NUFERTO Nutrient 069



SKU: SRC-5452F86CBCE35692

Kategoria: Pozostałe produkty żywienia roślin

Formuła: Potwierdź dla aktualnej partii

Opakowanie: Potwierdź dla aktualnej partii

Cena na zapytanie

[Zobacz produkt online](#)

Opis

NUFERTO Nutrient 069 - Pozostałe produkty żywienia roślin.

Przy wyborze produktu uwzględnij łącznie skład, warunki stosowania i aktualną etykietę.

Informacje techniczne

Gwarantowany skład	% W/W
Całkowita materia organiczna:	24
Węgiel organiczny:	9
Azot całkowity (N):	1
Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O):	1
Zakres pH:	4-6

Rośliny	Termin stosowania	Stosowanie dolistne	Doglebowo (Nawadnianie kropłowe)
Wszystkie uprawy: Uprawa warzyw w szklarniach (Pomidor, Papryka, Bakłażan, Ogórek, Fasola, Truskawka, Banan, itp.)	Dolistnie: rozpocząć 20 dni po sadzeniu i powtarzać co 10 dni do końca zbiorów. Nawadnianie kropłowe: zabieg 1 podczas ukorzeniania, 10-15 dni po sadzeniu; zabieg 2 w połowie sezonu.	200-250 cc/100 lt wody	1 - 1,5 lt /da.
Rośliny	Termin stosowania	Stosowanie dolistne	Doglebowo (Nawadnianie kropłowe)
Wszystkie uprawy: Gruntowa uprawa warzyw	Dolistnie: 20 dni po sadzeniu W odstępach 10	200-250 cc/100 lt wody	1,5 - 2 lt /da.

Rośliny	Termin stosowania	Stosowanie dolistne	Doglebowo (Nawadnianie kropłowe)
(Pomidor, Papryka, Bakłażan, Ogórek, Fasola, Herbata, Truskawka, itp.)	dni Stosować do końca zbiorów.		
Wszystkie uprawy: Warzywa liściowe (Kalafior, Por, Szpinak, Sałata, Sałata kędzierzawa, Sałata lodowa, itp.)	Dolistnie: rozpocząć 20 dni po sadzeniu i powtarzać co 10 dni do końca zbiorów. Nawadnianie kropłowe: zabieg 1 podczas ukorzeniania, 10-15 dni po sadzeniu; zabieg 2 w połowie sezonu.	200-250 cc/100 lt wody	1 - 1,5 lt /da.
Melon, Arbuz, Cukinia, Rzodkiew, Cebula, Marchew, Ziemniak itp.	Dolistnie: rozpocząć 20 dni po sadzeniu i powtarzać co 10 dni do końca zbiorów. Nawadnianie kropłowe: zabieg 1 podczas ukorzeniania, 10-15 dni po sadzeniu; zabieg 2 w połowie sezonu.	200-250 cc/100 lt wody	1 - 1,5 lt /da.
Drzewa owocowe (Jabłko, Gruszka, Brzoskwinia, Morela, Pigwa, Czereśnia, Wiśnia, Winorośl, Oliwka, Cytrusy, itp.)	Zaleca się trzy zabiegi. 1. Tuż przed pąkowaniem i kwitnieniem 2. Podczas tworzenia owoców 3. Do końca zbiorów	200-250 cc/100 lt wody	2 - 2,5 lt /da. lub Na drzewo 100 cc/100 lt wody / drzewo
Pistacja, Orzech laskowy, Migdał, Orzech włoski	Wykonać 2 zabiegów co 15 dni od sadzenia.	200-250 cc/100 lt wody	2 - 2,5 lt /da.
Wszystkie uprawy: Uprawy polowe (Pszemica, Jęczmień, Ryż, Ciecierzycy, Soczewica, itp.)	Wykonać dwa zabiegi; Zabieg 1: Razem z herbicydami Zabieg 2: W fazie krzewienia	200-250 cc/100 lt wody	1 lt /da.
Wszystkie uprawy: Rośliny przemysłowe (Burak cukrowy, Orzeszek ziemny, Kukurydza, Soja, Tytoń, Bawełna, Słonecznik, itp.)	Gdy rośliny osiągną wysokość 5-10 cm, wykonać 2 zabiegów co 20 dni.	200-250 cc/100 lt wody	2 - 2,5 lt /da.
Kwiaty cięte, Tereny zielone	Wykonać 2 zabiegów co 15 dni, od sadzenia do końca zbiorów.	200-250 cc/100 lt wody	2 - 2,5 lt /da.

Dostępność, opakowanie, ceny i parametry partii są potwierdzane w ofercie. Stosuj aktualną etykietę i instrukcje. Grafiki opakowań mają charakter poglądowy.

Kontakt i zamówienia

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727