

NUFERTO Nutrient 069



SKU: SRC-5452F86CBCE35692

Categorie: Alte produse de nutriție vegetală

Formulă: Confirmați pentru lotul actual

Ambalaj: Confirmați pentru lotul actual

Preț la cerere

[Vezi produsul online](#)

Descriere

NUFERTO Nutrient 069 - Alte produse de nutriție vegetală.

La alegerea produsului, analizați împreună compoziția, condițiile de aplicare și eticheta actuală.

Informații tehnice

Conținut garantat	% W/W
Materie organică totală:	24
Carbon organic:	9
Azot total (N):	1
Oxid de potasiu solubil în apă (K ₂ O):	1
Interval de pH:	4-6

Culturi	Moment de aplicare	Aplicare foliară	La sol (Irigare prin picurare)
Toate culturile: Legumicultură în seră (Tomate, Ardei, Vinete, Castraveți, Fasole, Căpșuni, Bananier, etc.)	Foliar: Începeți la 20 zile după plantare, apoi repetați la fiecare 10 zile până la sfârșitul recoltării. Prin picurare: aplicarea 1 la înrădăcinare, la 10-15 zile după plantare; aplicarea 2 la mijlocul sezonului.	200-250 cc/100 lt apă	1 - 1,5 lt /da.
Toate culturile: Legumicultură în câmp deschis (Tomate, Ardei, Vinete, Castraveți, Fasole, Ceai, Căpșuni, etc.)	Foliar: La 20 zile după plantare La intervale de 10 zile Se aplică până la sfârșitul recoltării.	200-250 cc/100 lt apă	1,5 - 2 lt /da.

Culturi	Moment de aplicare	Aplicare foliară	La sol (Irigare prin picurare)
Toate culturile: Legume cu frunze comestibile (Conopidă, Praz, Spanac, Salată, Salată creată, Salată iceberg, etc.)	Foliar: Începeți la 20 zile după plantare, apoi repetați la fiecare 10 zile până la sfârșitul recoltării. Prin picurare: aplicarea 1 la înrădăcinare, la 10-15 zile după plantare; aplicarea 2 la mijlocul sezonului.	200-250 cc/100 lt apă	1 - 1,5 lt /da.
Pepene galben, Pepene verde, Dovlecel, Ridiche, Ceapă, Morcov, Cartof etc.	Foliar: Începeți la 20 zile după plantare, apoi repetați la fiecare 10 zile până la sfârșitul recoltării. Prin picurare: aplicarea 1 la înrădăcinare, la 10-15 zile după plantare; aplicarea 2 la mijlocul sezonului.	200-250 cc/100 lt apă	1 - 1,5 lt /da.
Pomi fructiferi (Mere, Pere, Piersici, Caise, Gutui, Cireșe, Vișine, Viță-de-vie, Măslin, Citrice, etc.)	Se recomandă trei aplicări. 1.Imediat înainte de îmbobocire și înflorire 2.La formarea fructelor 3.Până la sfârșitul recoltării	200-250 cc/100 lt apă	2 - 2,5 lt /da. sau Per pom 100 cc/100 lt apă / pom
Fistic, Alune, Migdal, Nuc	Se efectuează 2 aplicări la intervale de 15 zile de la plantare.	200-250 cc/100 lt apă	2 - 2,5 lt /da.
Toate culturile: Culturi de câmp (Grâu, Orz, Orez, Năut, Linte, etc.)	Se efectuează două aplicări; Aplicarea 1: Împreună cu erbicidele Aplicarea 2: În faza de înfrățire	200-250 cc/100 lt apă	1 lt /da.
Toate culturile: Plante industriale (Sfeclă de zahăr, Arahide, Porumb, Soia, Tutun, Bumbac, Floarea-soarelui, etc.)	Când plantele ajung la 5-10 cm, efectuați 2 aplicări la intervale de 20 zile.	200-250 cc/100 lt apă	2 - 2,5 lt /da.
Flori tăiate, Spații verzi	Se efectuează 2 aplicări la intervale de 15 zile, de la plantare până la sfârșitul recoltării.	200-250 cc/100 lt apă	2 - 2,5 lt /da.

Disponibilitatea, ambalajul, prețurile și specificațiile lotului se confirmă în ofertă. Respectați eticheta și instrucțiunile actuale. Imaginile ambalajelor sunt ilustrative.

Contact și comenzi

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727