

# NUFERTO Amino 025



SKU: SRC-D2D4DE52926B3998

Catégorie: Acides aminés

Formule: À confirmer pour le lot actuel

Conditionnement: À confirmer pour le lot actuel

## Prix sur demande

[Consulter le produit en ligne](#)

## Description

NUFERTO Amino 025 - Acides aminés.

Pour choisir un produit, examinez ensemble sa composition, les conditions d'application et l'étiquette actuelle.

## Informations techniques

| Composition garantie                         | % W/W |
|----------------------------------------------|-------|
| Matière organique totale:                    | 30    |
| Carbone organique:                           | 12    |
| Azote organique (N):                         | 2     |
| Oxyde de potassium soluble dans l'eau (K2O): | 2     |
| Acides aminés libres:                        | 6     |
| pH:                                          | 4-6   |

| Cultures               | Période d'application                                                                                           | Application foliaire    | Application au sol |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Légumes sous serre     | Commencer 10-15 jours après la levée ou la plantation des plants, puis poursuivre jusqu'à la fin de la récolte. | 200-250 cc/100 lt.d'eau | 400-450 cc/da.     |
| Légumes de plein champ | Commencer 10-15 jours après la levée ou la plantation des plants, puis poursuivre jusqu'à la fin de la récolte. | 250-300 cc/100 lt.d'eau | 450-500 cc/da.     |

| Cultures                                     | Période d'application                                                                                                                               | Application foliaire    | Application au sol |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Légumes-feuilles                             | Pendant toute la croissance                                                                                                                         | 250-300 cc/100 lt.d'eau | 450-500 cc/da.     |
| Betterave sucrière                           | Après le semis, avant la levée, avec l'herbicide                                                                                                    | 200-250 cc/100 lt.d'eau | 450-500 cc/da.     |
| Carotte, Pomme de terre etc.                 | Appliquer 15-30-45-60 jours après plantation ou apparition des premières pousses.                                                                   | 200-250 cc/100 lt.d'eau | 450-500 cc/da.     |
| Fruits à pépins                              | Au printemps, dès le début de la croissance des racines et des pousses, puis pendant toute la croissance                                            | 200-250 cc/100 lt.d'eau | 450-500 cc/da.     |
| Fruits à noyau                               | Au printemps, dès le début de la croissance des racines et des pousses, puis pendant toute la croissance                                            | 200-250 cc/100 lt.d'eau | 450-500 cc/da.     |
| Fraise, Bananier                             | 10-15 jours après repiquage des plants À partir de la floraison                                                                                     | 200-250 cc/100 lt.d'eau | 400-450 cc/da.     |
| Agrumes                                      | Au printemps, dès le début de la croissance des racines et des pousses, puis pendant toute la croissance                                            | 200-250 cc/100 lt.d'eau | 500-550 cc/da      |
| Olivier, Noyer, Amandier etc.                | Au printemps, dès le début de la croissance des racines et des pousses, puis pendant toute la croissance                                            | 150-200 cc/100 lt.d'eau | 250-300 cc/da.     |
| Vigne                                        | Du début de la croissance des racines et des pousses au printemps jusqu'à la récolte. Après récolte, effectuer 2 applications espacées de 15 jours. | 150-200 cc/100 lt.d'eau | 300-350 cc/da.     |
| Céréales, Céréales et Cultures industrielles | Au début du tallage et au début de la floraison                                                                                                     | 300-350 cc/100 lt.d'eau | 350-400 cc/da      |

Disponibilité, conditionnement, prix et caractéristiques du lot sont confirmés dans le devis. Suivez l'étiquette et les instructions actuelles. Les visuels d'emballage sont illustratifs.

## Contact et commandes

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727