

NUFERTO Nutrient 066



SKU: SRC-8210479CB44FFA66

Categoria: Altri prodotti per la nutrizione vegetale

Formula: Da confermare per il lotto attuale

Confezionamento: Da confermare per il lotto attuale

Prezzo su richiesta

[Visualizza il prodotto online](#)

Descrizione

NUFERTO Nutrient 066 - Altri prodotti per la nutrizione vegetale.

Quando scegli un prodotto, valuta insieme composizione, condizioni d'impiego ed etichetta attuale.

Informazioni tecniche

Composizione garantita	% W/W
Sostanza organica totale:	25
Azoto totale (N):	1
Carbonio organico:	12
Ossido di potassio solubile in acqua (K2O):	1,5
Intervallo di pH:	4-6

Coltura	Al suolo (Sistema di irrigazione a goccia)	Per via fogliare
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Fagiolo, Pisello	Iniziare 15 giorni dopo il trapianto e ripetere ogni 20 giorni fino alla fine della raccolta. A ogni applicazione, aggiungere 3-4 lt/da all'acqua d'irrigazione.	200 cc/100 lt acqua.
Zucchini, Anguria, Melone	All'allungamento dei tralci, all'allegagione e poi ogni 20 giorni. A ogni applicazione, aggiungere 3-4 lt/da all'acqua d'irrigazione.	200 cc/da.

Coltura	Al suolo (Sistema di irrigazione a goccia)	Per via fogliare
Spinacio, Cavolo, Cavolfiore, Porro, Lattuga, Prezzemolo	Dallo stadio di 3-4 foglie, ogni 20 giorni. A ogni applicazione, aggiungere 2-3 lt/da all'acqua d'irrigazione.	250 cc/100 lt acqua.
Fiori recisi	Prima della fioritura, ogni 20 giorni: aggiungere 2 lt per decare all'acqua d'irrigazione.	
Fragola	Durante la crescita, ogni 20 giorni. A ogni applicazione, aggiungere 4-5 lt/da all'acqua d'irrigazione.	200 cc/100 lt acqua.
Patata, Barbabietola da zucchero Cipolla, Aglio e Ravanella	Dallo stadio di 3-4 foglie, ogni 20 giorni. A ogni applicazione, aggiungere 3-4 lt/da all'acqua d'irrigazione.	
Agrumi, Mela, Kiwi Pera, Pesca, Cotogno, Prugna, Ciliegia, Nettare, Albicocca, Banano, Fragola	Applicazione 1: a febbraio-marzo. Applicazione 2: dopo l'allegagione. A ogni applicazione, aggiungere 0,5 lt per albero all'acqua d'irrigazione.	200 cc/100 lt acqua.
Vite	Durante la crescita, ogni 20 giorni. A ogni applicazione, aggiungere 4-5 lt/da all'acqua d'irrigazione.	150 cc/100 lt acqua.
Mais	A ogni irrigazione, aggiungere 4 lt/da all'acqua.	200 cc/100 lt acqua.
Tabacco, Girasole	A ogni irrigazione, aggiungere 4 lt/da all'acqua.	200 cc/100 lt acqua.
Cotone	Applicazione 1: all'inizio della vegetazione. Applicazione 2: prima della formazione delle capsule. Applicazione 3: dopo 20 giorni. A ogni applicazione, aggiungere 4 lt/da all'acqua d'irrigazione.	200 cc/100 lt acqua.
Aree verdi	Dopo il primo sfalcio primaverile, poi una volta ogni 2 mesi. A ogni applicazione, aggiungere 3 lt/da all'acqua d'irrigazione.	
Frumento, Orzo, Riso	Durante la levata:	200 cc/da.

Disponibilità, confezionamento, prezzi e specifiche del lotto sono confermati nel preventivo. Seguire l'etichetta e le istruzioni aggiornate. Le immagini delle confezioni sono illustrative.

Contatti e ordini

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: [+90 532 551 89 99](https://wa.me/905325518999)

Oman: [+965 9887 1727](https://wa.me/96598871727)