

NUFERTO Nutrient 068



SKU: SRC-711C686D8AF74FE2

Catégorie: Autres produits de nutrition végétale

Formule: À confirmer pour le lot actuel

Conditionnement: À confirmer pour le lot actuel

Prix sur demande

[Consulter le produit en ligne](#)

Description

NUFERTO Nutrient 068 - Autres produits de nutrition végétale.

Pour choisir un produit, examinez ensemble sa composition, les conditions d'application et l'étiquette actuelle.

Informations techniques

Composition garantie	% W/W
Matière organique totale:	40
Azote total (N):	1
Carbone organique:	18
Oxyde de potassium soluble dans l'eau (K ₂ O):	2
Plage de pH:	4-6

Culture	Au sol (Système d'irrigation goutte à goutte)	Par voie foliaire
Plein champ et Cultures industrielles (Céréales, Maïs, Soja, Tabac, Cotonnier, Tournesol, Cultures fourragères, Betterave sucrière, Arachide etc.)		Deux applications : 1. Au moment du traitement herbicide : 400-450 cc/100 lt d'eau. 2. À la montaison : 400-450 cc/100 lt d'eau.
Maraîchage sous serre (Tomate, Poivron, Aubergine, Concombre, Melon, Pastèque, Courgette, Pomme de terre, Fraise, Oignon, Ail, Carotte, Laitue etc.)	Appliquer 1600-2200 cc par decare sur le lit de semences ou dans la zone racinaire, en trois passages distincts.	Commencer au repiquage ou au stade 3-4 feuilles. Effectuer trois applications à raison de 300 cc/100 lt d'eau.

Culture	Au sol (Système d'irrigation goutte à goutte)	Par voie foliaire
Maraîchage de plein champ (Tomate, Poivron, Aubergine, Concombre, Melon, Pastèque, Courgette, Pomme de terre, Fraise, Oignon, Ail, Carotte, Laitue, Céleri, Épinard)	Appliquer 2200-2500 cc par decare sur le lit de semences ou dans la zone racinaire, en trois passages distincts.	Commencer au repiquage ou au stade 3-4 feuilles. Effectuer trois applications à raison de 350 cc/100 lt d'eau.
Fruits (Arbres fruitiers à noyau et à pépins, Bananier, Agrumes, Vigne, Olivier, Noiset, Pistachier etc.)	Appliquer 80-100 cc par arbre dans la zone racinaire, par goutte à goutte ou irrigation par submersion, en trois passages distincts.	Trois applications recommandées : 1. Bourgeonnement et floraison : 400 cc pour 100 lt d'eau. 2. Formation des fruits : 400 cc pour 100 lt d'eau. 3. Mi-saison, pendant la croissance des fruits : 400 cc pour 100 lt d'eau.
Espaces verts		À partir du printemps À intervalles de 20-30 jours: 450 cc/100 lt d'eau
Fleurs coupées	Appliquer 2000-2200 cc par decare dans la zone racinaire, en trois passages distincts.	Effectuer trois applications dès le stade 3-4 feuilles des plantes ornementales. Mélanger 300 cc à 100 lt d'eau et pulvériser sur les feuilles.

Disponibilité, conditionnement, prix et caractéristiques du lot sont confirmés dans le devis. Suivez l'étiquette et les instructions actuelles. Les visuels d'emballage sont illustratifs.

Contact et commandes

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727