

NUFERTO Micro 016



SKU: SRC-C2E3EC543D1145FA

Kategoria: Mikroelementy

Formuła: Potwierdź dla aktualnej partii

Opakowanie: Potwierdź dla aktualnej partii

Cena na zapytanie

[Zobacz produkt online](#)

Opis

NUFERTO Micro 016 - Mikroelementy.

Przy wyborze produktu uwzględnij łącznie skład, warunki stosowania i aktualną etykietę.

Informacje techniczne

Gwarantowany skład	% W/W
Żelazo rozpuszczalne w wodzie (Fe):	6
Żelazo chelatowane przez EDTA (Fe):	6
Zakres pH stabilności żelaza (Fe):	3-11

Roślina	Termin stosowania	Liczba zabiegów	Dolistnie gramy/dekar (1 000 m ²) (Z 100 lt wody)	Przez nawadnianie kroplowe gramy/dekar (1 000 m ²) (Z 1 tonami wody)
Pomidor, Papryka, Bakłażan, Ogórek, Cukinia, Melon, Arbuz	Od posadzenia rozsady do 15-20 dni przed zbiorem	co tydzień	75-100 gr/da.	200-250 gr/da.
Warzywa liściowe Sałata- Sałata kędzierzawa-Kapusta itp.	Rozpocząć przed rozwinięciem liścia numer 5	co tydzień	75-100 gr/da.	200-250 gr/da.
Truskawka	Gdy owoce zaczynają czerwienieć, w przypadku wystąpienia niedoboru.	co tydzień	75-100 gr/da.	150-200 gr/da.

Roślina	Termin stosowania	Liczba zabiegów	Dolistnie gramy/dekar (1 000 m ²) (Z 100 lt wody)	Przez nawadnianie kroplowe gramy/dekar (1 000 m ²) (Z 1 tonami wody)
Winorośl, Kiwi	Od początku tworzenia pędów	3-4 zabiegów	75-100 gr/da.	100-150 gr/da.
Banan	Zabieg 1: Przy pojawieniu się nowych pędów 2.W okresie wzrostu 3.Przy wystąpieniu niedoboru	3-4 zabiegów	200-250 gr/da.	300-350 gr/da
Cytrusy	Zabieg 1: 10-15 dni przed kwitnieniem 2.Miesiąc później 2. Zastosowanie. 3.W okresie wzrostu 4.Przy wystąpieniu niedoboru	3-4 zabiegów	100-150 gr/da.	200-250 gr/da.
Czereśnia, Wiśnia, Brzoskwinia, Morela, Śliwka, Jabłko, Gruszka, Oliwka, Pistacja-Orzech laskowy-Orzech włoski	Zabieg 1: Po rozpoczęciu wzrostu pędów, 2.W okresie wzrostu 3.Przy wystąpieniu niedoboru	3-4 zabiegów	75-100 gr/da.	200-250 gr/da.
Bawełna	Zabieg 1: Na początku tworzenia pąków kwiatowych bawełny 2. Przed tworzeniem torebek nasiennych	2 zabiegów	100 gr/da. 150 gr/da.	200-250 gr/da.
Kukurydza-Słonecznik - Pszemica-Jęczmień-Ryż	Zabieg 1: Przed krzewieniem 2.W fazie strzelania w źdźbło	2 zabiegów	100 gr/da. 150 gr/da.	200-250 gr/da.
Ziemniak-Burak cukrowy	W fazie wzrostu bulw	2 zabiegów	75-100 gr/da.	200-250 gr/da.
Marchew-Cebula-Czosnek	Od fazy 5-6 liści	2 zabiegów	75-100 gr/da.	200-250 gr/da.
Tereny zielone-Kwiaty cięte	W okresie wzrostu, gdy wystąpi niedobór żelaza	2-5 zabiegów	100-150 gr/da	200-250 gr/da.

Dostępność, opakowanie, ceny i parametry partii są potwierdzane w ofercie. Stosuj aktualną etykietę i instrukcje. Grafiki

opakowań mają charakter poglądowy.

Kontakt i zamówienia

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727