

NUFERTO Liquid 001



SKU: SRC-78474ADC00BCDE0E

Catégorie: Engrais liquides

Formule: À confirmer pour le lot actuel

Conditionnement: À confirmer pour le lot actuel

Prix sur demande

[Consulter le produit en ligne](#)

Description

NUFERTO Liquid 001 - Engrais liquides.

Pour choisir un produit, examinez ensemble sa composition, les conditions d'application et l'étiquette actuelle.

Informations techniques

Composition garantie	% W/W
Fer soluble dans l'eau (Fe):	6

Culture	Période d'application	Par voie foliaire (Avec 100 lt d'eau)	Par irrigation goutte à goutte
Légumes; Tomate, Poivron, Aubergine, Concombre, Courgette, Haricot, Pois, Gombo, Artichaut etc.	3-4 applications, une semaine après repiquage jusqu'à la maturité des fruits	100-150 cc	250-400 cc/da.
Légumes-feuilles; Laitue- Laitue frisée-Chou, Poireau, Épinard etc.	Tous les 15 jours pendant toute la saison, dès le stade plant	100-150 cc	350-500 cc/da.
Cultures à tubercules; Betterave sucrière, Oignon, Ail, Pomme de terre. Navet, Carotte, etc.	Après le deuxième binage À intervalles de 21 jours Appliquer pendant toute la saison	150-200 cc	350-500 cc/da.
Arbres fruitiers; Pomme, Poire, Abricot, Amandier, Prune, Cerise douce, Coing, Pêche, Grenade, Figue, Olivier etc.	2-3 applications de la nouaison au grossissement des fruits, jusqu'à la période précédant la récolte	150-200 cc	500-600 cc/da. ou 50 cc/arbre

Culture	Période d'application	Par voie foliaire (Avec 100 lt d'eau)	Par irrigation goutte à goutte
Fraise, Framboise, Myrtille	Effectuer 2-3 applications avant floraison et à la nouaison.	100-150 cc	250-400 cc/da.
Noisette, Pistachier, Noyer, Amandier	2-3 applications avant floraison, à la nouaison, pendant le grossissement et avant récolte	150-200 cc	500-600 cc/da. ou 50 cc/arbre
Bananier	Effectuer 2-3 applications avant et après la formation des fruits	150-200 cc	500-600 cc/da. ou 50 cc/arbre
Viticulture (Vigne)	Effectuer 2-3 applications pendant la nouaison, le grossissement et la coloration des fruits	150-200 cc	400-500 cc/da. ou 10 cc/cep
Melon, Pastèque, Courgette	Après le deuxième binage À intervalles de 21 jours Appliquer pendant toute la saison	150-200 cc	500-600 cc/da.
Légumineuses; Pois chiche, Lentille, Haricot, Soja, Arachide	Après le deuxième binage À intervalles de 21 jours Effectuer 2-3 applications	150-200 cc	500-600 cc/da.
Cultures industrielles; Cotonnier, Maïs, Thé, Tournesol, Colza canola, Tabac	Après le deuxième binage À intervalles de 21 jours Effectuer 2-3 applications	150-200 cc	500-600 cc/da.
Céréales, Grandes cultures Blé, Orge, Riz, Lentille, Pois chiche etc.	Avec l'herbicide, au tallage et ensuite, effectuer 2-3 applications espacées de 15 jours.	150-200 cc	
Espaces verts et Cultures fourragères; Luzerne, Sainfoin, Vesce, etc.	Appliquer 10 jours après chaque coupe.	150-200 cc	
Fleurs coupées	Appliquer chaque semaine à partir du développement des feuilles et pendant le reste de la saison	100-150 cc	250-400 cc/da.

Disponibilité, conditionnement, prix et caractéristiques du lot sont confirmés dans le devis. Suivez l'étiquette et les instructions actuelles. Les visuels d'emballage sont illustratifs.

Contact et commandes

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727