

# NUFERTO Micro 021



SKU: SRC-58AEA6BFFDF00255

Catégorie: Oligo-éléments

Formule: À confirmer pour le lot actuel

Conditionnement: À confirmer pour le lot actuel

## Prix sur demande

[Consulter le produit en ligne](#)

## Description

NUFERTO Micro 021 - Oligo-éléments.

Pour choisir un produit, examinez ensemble sa composition, les conditions d'application et l'étiquette actuelle.

## Informations techniques

| Composition garantie                   | % W/W |
|----------------------------------------|-------|
| Fer soluble dans l'eau (Fe):           | 6     |
| Fer chélaté par EDDHA (Fe):            | 6     |
| Plage de pH de stabilité du fer (Fe) : | 3-10  |

| Culture                                                 | Période d'application                                                                                                           | Dose d'application au sol |                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Par arbre                                               | Par goutte à goutte                                                                                                             |                           |                |
| Culture de légumes<br>(Tomate, Poivron, Aubergine etc.) | *Après le repiquage des plants<br>*Après les premiers fruits                                                                    |                           | 250-500 gr/da. |
| Melon, Pastèque, Courgette                              | *10 jours après repiquage<br>*Après les premiers fruits                                                                         |                           | 250-500 gr/da. |
| Vigne                                                   | *Lorsque les pousses atteignent 40 cm<br>*Lorsque les baies atteignent la taille de petits plombs<br>*Au stade des baies vertes | 20-30 gr/cep              |                |

| Culture                  | Période d'application  | Dose d'application au sol |  |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|--|
| Arbres fruitiers (Pomme, | *Avant l'ouverture des | 50-200 gr/arbre           |  |

| Culture                                                         | Période d'application                                                                                                                        | Dose d'application au sol |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Coing, Cerise douce, Pêche, Poire, Abricot etc.)                | fleurs *Pendant la fructification 2 applications                                                                                             |                           |                |
| Olivier, Pistachier                                             | *Au début de la croissance végétative *Au printemps, avant la formation des boutons et des fleurs                                            | 50-200 gr/arbre           |                |
| Agrumes                                                         | *Avant floraison *Lorsque les fruits ont la taille d'une noisette                                                                            | 50-200 gr/arbre           |                |
| Fraise, Framboise                                               | À partir de 4-6 semaines après plantation, répartir la dose totale pendant toute la croissance végétative, en fonction du mode d'irrigation. |                           | 500-1000 gr/da |
| Fleurs coupées                                                  | *Lorsque les plantes ont 3-5 feuilles *Pendant la croissance                                                                                 |                           | 500-1000 gr/da |
| Betterave sucrière, Carotte, Radis, Oignon, Ail, Pomme de terre | *Lorsque les plantes ont 3-5 feuilles *Pendant la croissance                                                                                 |                           | 250-500 gr/da. |
| Soja, Pois chiche, Pois, Arachide                               | *Avant floraison *20 jours après floraison                                                                                                   |                           | 250-500 gr/da  |
| Cotonnier                                                       | Lorsque les plantes ont 3-5 feuilles                                                                                                         |                           | 250-500 gr/da  |
| Maïs                                                            | *Lorsque les plantes ont 3-5 feuilles *À l'apparition de la panicule terminale                                                               |                           | 250-500 gr/da  |
| Orge, Blé, Riz                                                  | *Au tallage, avec l'herbicide                                                                                                                |                           | 100-150 gr/da  |

Disponibilité, conditionnement, prix et caractéristiques du lot sont confirmés dans le devis. Suivez l'étiquette et les instructions actuelles. Les visuels d'emballage sont illustratifs.

## Contact et commandes

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727