

NUFERTO Micro 021



SKU: SRC-58AEA6BFFDF00255

Categoria: Microelementi

Formula: Da confermare per il lotto attuale

Confezionamento: Da confermare per il lotto attuale

Prezzo su richiesta

[Visualizza il prodotto online](#)

Descrizione

NUFERTO Micro 021 - Microelementi.

Quando scegli un prodotto, valuta insieme composizione, condizioni d'impiego ed etichetta attuale.

Informazioni tecniche

Composizione garantita	% W/W
Ferro solubile in acqua (Fe):	6
Ferro chelato con EDDHA (Fe):	6
Intervallo di pH di stabilità del ferro (Fe):	3-10

Coltura	Epoca d'impiego	Dose di applicazione al suolo	
Per albero	Tramite irrigazione a goccia		
Coltivazione di ortaggi (Pomodoro, Peperone, Melanzana ecc.)	*Dopo il trapianto delle piantine *Dopo i primi frutti		250-500 gr/da.
Melone, Anguria, Zucchini	*10 giorni dopo il trapianto *Dopo i primi frutti		250-500 gr/da.
Vite	*Quando i germogli raggiungono 40 cm *Quando gli acini raggiungono la dimensione di pallini *Allo stadio di acini verdi	20-30 gr/ceppo	

Coltura	Epoca d'impiego	Dose di applicazione al suolo	
Alberi da frutto (Mela, Cotogno, Ciliegia, Pesca, Pera, Albicocca ecc.)	*Prima dell'apertura dei fiori *Durante la fruttificazione 2 applicazioni	50-200 gr/albero	
Olivo, Pistacchio	*All'inizio della crescita vegetativa *In primavera, prima della formazione di boccioli e fiori	50-200 gr/albero	
Agrumi	*Prima della fioritura *Quando i frutti hanno le dimensioni di una nocciola	50-200 gr/albero	
Fragola, Lampone	A partire da 4-6 settimane dopo il trapianto, suddividere la dose totale durante la crescita vegetativa in base al metodo d'irrigazione.		500-1000 gr/da
Fiori recisi	*Quando le piante hanno 3-5 foglie *Durante la crescita		500-1000 gr/da
Barbabietola da zucchero, Carota, Ravanella, Cipolla, Aglio, Patata	*Quando le piante hanno 3-5 foglie *Durante la crescita		250-500 gr/da.
Soia, Cece, Pisello, Arachide	*Prima della fioritura *20 giorni dopo la fioritura		250-500 gr/da
Cotone	Quando le piante hanno 3-5 foglie		250-500 gr/da
Mais	*Quando le piante hanno 3-5 foglie *Alla comparsa dell'infiorescenza apicale		250-500 gr/da
Orzo, Frumento, Riso	*Durante l'accestimento, insieme all'erbicida		100-150 gr/da

Disponibilità, confezionamento, prezzi e specifiche del lotto sono confermati nel preventivo. Seguire l'etichetta e le istruzioni aggiornate. Le immagini delle confezioni sono illustrative.

Contatti e ordini

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727