

NUFERTO NPK 061



SKU: SRC-669BB7E5DBA15090

Categoria: Concimi composti

Formula: Da confermare per il lotto attuale

Confezionamento: Da confermare per il lotto attuale

Prezzo su richiesta

[Visualizza il prodotto online](#)

Descrizione

NUFERTO NPK 061 - Concimi composti.

Quando scegli un prodotto, valuta insieme composizione, condizioni d'impiego ed etichetta attuale.

Informazioni tecniche

Composizione garantita	% W/W
Sostanza organica:	25
Azoto totale (N):	3
Azoto ureico (N):	0,5
Azoto organico (N):	2,5
Pentossido di fosforo totale(P2O5):	10
Pentossido di fosforo solubile in acqua (P2O5)	10
Boro solubile in acqua (B):	0,01
Ferro solubile in acqua (Fe):	0,02
Manganese solubile in acqua (Mn):	0,01
Molibdeno solubile in acqua (Mo):	0,01
Zinco solubile in acqua (Zn):	0,01
pH:	1-3

Coltura	Periodo e dose d'impiego
Ortaggi (Peperone, Pomodoro, Melanzana, Melone, Anguria,	Ogni 10-15 giorni Per applicazioni al suolo: 500-700 cc/da.

Coltura	Periodo e dose d'impiego
Cetriolo)	Per applicazioni fogliari: 150-200 cc/100 lt acqua
Alberi da frutto (Pomacee e drupacee) (Esclusi i susini)	Due applicazioni; Prima della fioritura e alla caduta dei petali; Per via fogliare: 500 cc/100 lt acqua
Barbabietola, Carota	Alla prima sarchiatura: 100 cc per decare al suolo, oppure 150-200 cc/100 lt d'acqua per via fogliare con gli erbicidi, dopo lo stadio di 4-5 foglie vere.
Agrumi	Applicazione al suolo:150-200 cc/da. Eseguire una applicazione.
Olivo	Al suolo: 200 cc per decare, in due applicazioni, prima della fioritura e dopo l'allegagione, con frutti di circa 5 mm di diametro.
Pistacchio	Due applicazioni fogliari: 1. A inizio primavera, all'ingrossamento delle gemme a frutto: 200 cc/100 lt d'acqua. 2. Quando i frutti raggiungono la dimensione di un chicco di grano, con i fungicidi: 200 cc/100 lt d'acqua.
Colture da pieno campo (Frumento, Mais, Tabacco, Riso, ecc.)	Per via fogliare: 150-200 cc/100 lt d'acqua. Una applicazione allo stadio di quattro foglie, oppure due con gli erbicidi dopo lo stadio di 4-5 foglie.
Colture industriali (Cotone, Girasole ecc.)	Due applicazioni: 1. All'accestimento, con gli erbicidi, per via fogliare: 250-300 cc/100 lt d'acqua, dopo le foglie vere numero 4 e 5. 2. All'inizio della spigatura: 150-200 cc/100 lt d'acqua per via fogliare, oppure 50-100 cc per decare al suolo.
Tappeto erboso, Aree verdi	Cura fogliare: irrorare 150 cc/100 lt d'acqua ogni due settimane. Alla comparsa del germoglio numero 2, irrorare 300 cc/100 lt d'acqua.
Piante ornamentali	Applicazione al suolo 100-150 cc/decare (1.000 m²).

Disponibilità, confezionamento, prezzi e specifiche del lotto sono confermati nel preventivo. Seguire l'etichetta e le istruzioni aggiornate. Le immagini delle confezioni sono illustrative.

Contatti e ordini

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727