

NUFERTO Amino 024



SKU: SRC-13F6C2CA35B3F62D

Categorie: Aminoacizi

Formulă: Confirmați pentru lotul actual

Ambalaj: Confirmați pentru lotul actual

Preț la cerere

[Vezi produsul online](#)

Descriere

NUFERTO Amino 024 - Aminoacizi.

La alegerea produsului, analizați împreună compoziția, condițiile de aplicare și eticheta actuală.

Informații tehnice

Culturi	Moment de aplicare	Aplicare foliară	La sol
Legume (În seră, în spații protejate și în câmp) (Tomate, Ardei, Vinete, Dovlecel, Castraveți, Fasole, Pepene galben, Pepene verde,	Aplicarea 1: La 10-15 zile după plantarea răsadurilor		200 cc /da.
Aplicarea 2: În perioada de dezvoltare vegetativă		200 cc /da.	
Aplicarea 3: În perioada de creștere a fructelor		200 cc /da.	
În perioada de dezvoltare vegetativă	100 cc /100 lt apă		
În perioada de creștere a fructelor	100 cc /100 lt apă		
Plante tuberculoase (Sfeclă de zahăr, Cartof, Ceapă, Morcov etc.)	După prima prașilă	100 cc /100 lt apă	
În perioada de formare a tuberculilor	100 cc /100 lt apă		
În stadiul de 6-8 frunze		200 cc /da.	

Culturi	Moment de aplicare	Aplicare foliară	La sol
Plante cu frunze comestibile (Conopidă, Praz, Spanac, Salată, Salată crească, Salată iceberg, etc.)	La 10-15 zile după plantarea răsadurilor		200 cc /da.
În perioada de dezvoltare vegetativă		200 cc /da.	
În stadiul de 8-10 frunze	100 cc /100 lt apă		
Cu 15-20 zile înainte de recoltare	100 cc /100 lt apă		
Leguminoase (Fasole, Bob, Năut, Soia, Linte, Mazăre, etc.)	În perioada de dezvoltare vegetativă	100 cc /100 lt apă	200 cc /da.
În perioada de înflorire	100 cc /100 lt apă		
În perioada de formare a capsulelor	100 cc /100 lt apă		
Fructe sâmburoase (Măslin, Cireșe, Vișine, Caise, Piersici, Prune etc.)	Cu apa de la prima irigare		200 cc /da.
În perioada de umplere și creștere a fructelor		200 cc /da.	
Aplicarea 1: Înainte de înflorire	100 cc /100 lt apă		
Aplicarea 2: Cu 30 zile înainte de recoltare	100 cc /100 lt apă		
Fructe semințoase (Mere, Pere, Gutui, Curmal, Smochin, etc.)	Aplicarea 1: În martie sau aprilie		200 cc /da
Aplicarea 2: În mai sau iunie		200 cc /da	
Aplicarea 1: La începutul înfrunzirii	100 cc /100 lt apă		
Aplicarea 2: Când lăstarii ajung la 15-20 cm	100 cc /100 lt apă		
Aplicarea 3: Când fructele au mărimea unei alune mici	100 cc /100 lt apă		
Aplicarea 4: La 15-20 zile după a treia aplicare	100 cc /100 lt apă		

Culturi	Moment de aplicare	Aplicare foliară	La sol
Fructe nucifere (Fistic, Alune, Migdal, Nuc, Castan comestibil etc.)	În mai sau iunie (La 1 tone de apă)		200 cc /da.
Aplicarea 1: La începutul înfrunzirii	100 cc /100 lt apă		
Aplicarea 2: Când fructele au mărimea unei linte	100 cc /100 lt apă		
Aplicarea 3: În octombrie	100 cc /100 lt apă		
Culturi de câmp (Grâu, Orz, Orez, Ovăz, Secară etc.)	Aplicarea 1: La începutul înfrățirii	100 cc /100 lt apă	
Aplicarea 2: La 15-20 zile după prima aplicare	100 cc /100 lt apă		
Plante industriale (Arahide, Soia, Tutun, Bumbac, Floarea-soarelui, etc.)	Aplicarea 1: La prima irigare		200 cc /da
Aplicarea 2: Când plantele ajung la înălțimea de 15-20 cm		200 cc /da	
Aplicarea 1: Când plantele au înălțimea de 15-20 cm	100 cc /100 lt apă		
Aplicarea 2: Când plantele au înălțimea de 20-25 cm	100 cc /100 lt apă		
Bumbac	La începutul formării bobocilor la bumbac		100 cc /da.
La începutul formării capsulelor de bumbac		100 cc /da.	
Porumb	Aplicarea 1: În stadiul de 8-10 frunze		200 cc /da.
Aplicarea 2: La apariția paniculelor		200 cc /da.	
Aplicarea 1: În stadiul de 8-10 frunze	100 cc /100 lt apă		
Aplicarea 2: Când planta are înălțimea de 50-60 cm	100 cc /100 lt apă		
Citrice (Portocale, Lămâi, Mandarin, Kumquat, Grepfrut, etc.)	Aplicarea 1: În martie sau aprilie		200 cc /da

Culturi	Moment de aplicare	Aplicare foliară	La sol
Aplicarea 2: În mai sau iunie		200 cc /da	
Aplicarea 1: Înainte de înflorire	100 cc /100 lt apă		
Aplicarea 2: După căderea florilor	100 cc /100 lt apă		
Aplicarea 3: Când fructele ajung la mărimea unei alune	100 cc /100 lt apă		
Aplicarea 4: Când fructele ajung la mărimea unei nuci	100 cc /100 lt apă		
Căpșuni	Aplicarea 1: Odată cu prima irigare după plantare		200 cc /da.
Aplicarea 2: La 15-20 zile după prima aplicare		200 cc /da	
Aplicarea 3: La 15-20 zile după a doua aplicare		200 cc /da	
Aplicarea 1: La 10-15 zile după plantare	100 cc /100 lt apă		
Aplicarea 2: La 15-20 zile după prima aplicare	100 cc /100 lt apă		
Aplicarea 3: La 15-20 zile după a doua aplicare	100 cc /100 lt apă		
Bananier	Aplicarea 1: Perioada dinaintea înfloririi		200 cc /da.
Aplicarea 2: La 30 zile după prima aplicare		200 cc /da.	
Aplicarea 3: La 30 zile după a doua aplicare		200 cc /da.	
Viță-de-vie	Aplicarea 1: În martie sau aprilie		200 cc /da
Aplicarea 2: În mai sau iunie		200 cc /da	
Aplicarea 1: La începutul înfrunzirii	100 cc /100 lt apă		
Aplicarea 2: Când lăstarii ajung la 15-20 cm	100 cc /100 lt apă		

Culturi	Moment de aplicare	Aplicare foliară	La sol
Aplicarea 3: În stadiul boabelor verzi mici	100 cc /100 lt apă		
Aplicarea 4: La 15-20 zile după a treia aplicare	100 cc /100 lt apă		
Ceai	Începeți în aprilie sau mai, apoi aplicați la fiecare 15 zile pe tot sezonul.	100 cc /100 lt apă	200 cc /da.
Flori tăiate & Plante ornamentale	Se efectuează 2 aplicări la intervale de 15 zile, de la plantare până la sfârșitul recoltării.	100 cc/100 lt apă	200 cc /da

Disponibilitatea, ambalajul, prețurile și specificațiile lotului se confirmă în ofertă. Respectați eticheta și instrucțiunile actuale. Imaginile ambalajelor sunt ilustrative.

Contact și comenzi

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727