

NUFERTO Micro 017



SKU: SRC-D3CE6C49D4995346

Categoria: Microelementi

Formula: Da confermare per il lotto attuale

Confezionamento: Da confermare per il lotto attuale

Prezzo su richiesta

[Visualizza il prodotto online](#)

Descrizione

NUFERTO Micro 017 - Microelementi.

Quando scegli un prodotto, valuta insieme composizione, condizioni d'impiego ed etichetta attuale.

Informazioni tecniche

Composizione garantita	% W/W
Boro solubile in acqua (B):	1,5
Rame solubile in acqua (Cu):	0,5
Ferro solubile in acqua (Fe):	4
Manganese solubile in acqua (Mn):	3
Molibdeno solubile in acqua (Mo):	0,06
Zinco solubile in acqua (Zn):	4

Coltura	Epoca d'impiego	Per via fogliare	Al suolo
Agumi	Dopo la caduta del 80% dei fiori; sulla vegetazione verde dopo la raccolta.	100-150 g/ 100 L acqua 100 g/ 100 L acqua	1,5 kg/ da (Per 20-25 alberi)
Alberi da frutto	Applicare prima della fioritura		1-1,5 kg/da
Banano	Dopo la caduta dei petali, eseguire 2 applicazioni ogni 15 giorni.	300 g/100 L acqua (Sistema di irrigazione a pioggia)	

Coltura	Epoca d'impiego	Per via fogliare	Al suolo
Vite	Prima della ritenzione dei fiori: All'allegagione: 1 mesi prima della raccolta:	50-75 g/ 100 L acqua 50-75 g/ 100 L acqua 50-75 g / 100 L acqua	05-1 kg/ da
Pistacchio	Alla caduta del 80% dei fiori; quando gli acini hanno le dimensioni di un chicco di grano.	50-75 g/ 100 L acqua 50-75 g / 100 L acqua	
Mais, Girasole	Quando la pianta è alta 45 cm (All'ultimo passaggio del trattore):	100 g/ da	
Cotone	Prima della fioritura Inizio della formazione dei bottoni fiorali del cotone 45 giorni prima della raccolta:	100 g/ da 100 g/ da 100 g/ da	
Olivo	Durante la fioritura: Alle dimensioni di un cece: 45 giorni prima della raccolta	100 g/ 100 L acqua 100 g/ 100 L acqua 100 g/ 100 L acqua	1,5 kg/ da (Per 20-25 alberi)
Cavolo,Cavolfiore, Pisello, Fagiolo	Allo stadio di 4-6 foglie; ripetere alla stessa dose se necessario.	100 g/ 100 L acqua	1,5 kg/ da
Patata, Barbabietola da zucchero	Quando la parte aerea emerge dal terreno:	100 g/ da	1 kg/ da
Cereali (Frumento, Orzo,Avena,Segale, Riso, Cece, Lenticchia)	Applicazione 1: Quando la pianta è alta 10 cm. Applicazione: Quando la pianta è alta 30-40 cm	75-100 g/ da 75-100 g/ da	
Ortaggi (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchini ecc.)	15 giorni dopo il trapianto: Prima dell'allegagione:	50-75 g/ 100 L acqua 50-75 g / 100 L acqua	0,5-1 kg / da

Disponibilità, confezionamento, prezzi e specifiche del lotto sono confermati nel preventivo. Seguire l'etichetta e le istruzioni aggiornate. Le immagini delle confezioni sono illustrative.

Contatti e ordini

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727