

NUFERTO NPK 063



SKU: SRC-2984AA89D0BF39E2

Catégorie: Engrais composés

Formule: À confirmer pour le lot actuel

Conditionnement: À confirmer pour le lot actuel

Prix sur demande

[Consulter le produit en ligne](#)

Description

NUFERTO NPK 063 - Engrais composés.

Pour choisir un produit, examinez ensemble sa composition, les conditions d'application et l'étiquette actuelle.

Informations techniques

Composition garantie	% W/W
Matière organique totale:	15
Azote total:	3
Azote organique:	0,5
Azote uréique:	2,5
Pentoxyde de phosphore total (P2O5):	7
Pentoxyde de phosphore soluble dans l'eau (P2O5):	7
Zinc soluble dans l'eau (Zn):	8
Chlorures, maximum (Cl):	1
pH:	1-3

Culture	Période d'application	Par voie foliaire	Par goutte à goutte
Blé	Avant tallage Lorsque la plante mesure 30 cm	100-150 ml/ da	

Culture	Période d'application	Par voie foliaire	Par goutte à goutte
Céréales (Orge, Avoine,	Avant tallage Lorsque la	100-150 ml/ da	

Culture	Période d'application	Par voie foliaire	Par goutte à goutte
Seigle, Riz, Pois chiche, Lentille)	plante mesure 30 cm		
Légumes (Tomate, Poivron, Aubergine, Concombre, Courgette, Fraise, Chou, Chou-fleur, Pois)	Au stade plantule Avant floraison Pendant toute la floraison	200 ml/100 L d'eau	1 L / da / semaine
Agrumes (Orange, Citron, Mandarine, Pamplemousse)	Avant floraison Fertilisation après récolte	200 ml/ 100 L d'eau	1-1,5 L / da (Pour 20-25 arbres)
Arbres fruitiers (Cerise douce, Pomme, Poire, Pêche, Abricot, Kiwi, Avocat, Grenade, Coing)	Au stade bouton, avant floraison Pendant la floraison 2 applications Fertilisation après récolte	200 ml/ 100 L d'eau	1-1,5 L / da (Pour 20-25 arbres)
Melon, Pastèque	Avant floraison Après la floraison	150-200 ml/ 100 L d'eau	
Bananier	Avant l'émission de l'inflorescence du bananier Après l'émission de l'inflorescence du bananier	200 ml/100 L d'eau 250 ml/100 L d'eau (Système d'aspersion)	1 L / da / semaine
Vigne	Avant la fixation des fleurs À la nouaison	150 ml/ 100 L d'eau	1 L / da
Pistachier	Après la formation des feuilles Lorsque les baies ont la taille d'un grain de blé Fertilisation après récolte	150-200 ml / 100 L d'eau	1-1,5 L / da (Pour 20-25 arbres)
Noyer, Amandier, Noisette	Après la formation des feuilles Fertilisation après récolte	200 ml / 100 L d'eau	1-1,5 L / da (Pour 20-25 arbres)
Arachide	Avant floraison	100 ml /da	
Maïs, Tournesol	Lorsque la plante mesure 45 cm (Lors du dernier passage du tracteur)	150-200 ml / da	1 L / da
Cotonnier	Avant floraison Début de la formation des boutons floraux du cotonnier	150-200 ml / da	1,5 L / da
Olivier	Pendant la floraison	150-200 ml / 100 L d'eau	1-1,5 L / da (Pour 20-25 arbres)
Betterave sucrière	Application 1 : Après binage 2.Après binage	150-200 ml / da	

Culture	Période d'application	Par voie foliaire	Par goutte à goutte
Oignon, Ail, Pomme de terre	Stade 4-6 feuilles	100-150 ml / da	1-1,5 L / da

Disponibilité, conditionnement, prix et caractéristiques du lot sont confirmés dans le devis. Suivez l'étiquette et les instructions actuelles. Les visuels d'emballage sont illustratifs.

Contact et commandes

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727