

NUFERTO NPK 059



SKU: SRC-E3394C124E3E6742

Catégorie: Engrais composés

Formule: À confirmer pour le lot actuel

Conditionnement: À confirmer pour le lot actuel

Prix sur demande

[Consulter le produit en ligne](#)

Description

NUFERTO NPK 059 - Engrais composés.

Pour choisir un produit, examinez ensemble sa composition, les conditions d'application et l'étiquette actuelle.

Informations techniques

Composition garantie	% W/W
Azote total (N):	3
Azote uréique (NH ₂ -N):	3
Pentaoxyde de phosphore total (P ₂ O ₅):	42
Teneur en chlorures (Cl):	0,21
Masse volumique:	1,4 gr/cc

Culture	Par voie foliaire	Au sol - Irrigation goutte à goutte
Légumes (Concombre, Poivron, Aubergine, Courgette Haricot, Pois, Tomate)	1. Après récolte. 2. Pendant la floraison : 100 cc/100 lt d'eau. Pour la transplantation et le repiquage, tremper les racines des plants dans une solution de Phyto-Fos préparée à 3 cc/lt.	Répéter tous les 15 jours: 500 cc/ da.
Betterave	Avant floraison: 100 cc / 100 lt d'eau Avant floraison: 100 cc / 100 lt. d'eau	Répéter tous les 15 jours: 500 cc/ da. Pendant le développement des tubercules 3 applications: 500 cc /da.

Culture	Par voie foliaire	Au sol - Irrigation goutte à goutte
Melon, Pastèque	Application 1 : Pendant la formation	500 cc / da.

Culture	Par voie foliaire	Au sol - Irrigation goutte à goutte
	des ramifications 2. Avant floraison: 100 cc / 100 lt. d'eau	
Cotonnier	Application 1 : Début de formation des boutons floraux du cotonnier 2. Avant floraison: 100 cc / da.	
Agrumes (Citron, Orange, Mandarine) Arbres fruitiers (Pomme, Poire, Prune, Abricot, Pêche, Cerise douce, Cerise acide)	Tous les 15-20 jours pendant la croissance, à partir de la floraison: 75-100 cc /100 lt. d'eau	Effectuer 3 applications, à la fin de mars, de juillet et de septembre. Sols calcaires : 500 cc/da. Sols à teneur normale en calcaire : 400 cc/da.
Vigne	Application 1 : Début de croissance 2. Après récolte: 50-75 cc /100 lt. d'eau	Deux applications; 1. Avant floraison: 500 cc/decare (1 000 m²) 2. Après récolte: 500 cc/decare (1 000 m²)
Tabac	Application 1 : Au stade plantule, 2. Après le premier binage: 100-150 cc/100 lt. d'eau	
Bananier	À l'émission de l'inflorescence du bananier: 100-150 cc / 100 lt d'eau	À l'émission de l'inflorescence du bananier: 500 cc / da.
Fraise, Framboise	2-3 applications à partir du repiquage et pendant la croissance végétative: 100 cc / 100 lt. d'eau	Deux applications; 1. Avant floraison: 500 cc/decare (1 000 m²) 2. Après récolte: 500 cc/decare (1 000 m²)
Blé, Orge, Riz, Avoine	Au tallage: 100 cc /da.	
Olivier, Noisettes, Noyer, Pistachier	Application 1 : Après récolte, 2. Pendant la floraison: 75-100 cc /100 lt. d'eau	Deux applications; 1. Avant floraison: 500 cc/decare (1 000 m²) 2. Après récolte: 500 cc/decare (1 000 m²)

Disponibilité, conditionnement, prix et caractéristiques du lot sont confirmés dans le devis. Suivez l'étiquette et les instructions actuelles. Les visuels d'emballage sont illustratifs.

Contact et commandes

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727