

NUFERTO NPK 059



SKU: SRC-E3394C124E3E6742

Categoria: Concimi composti

Formula: Da confermare per il lotto attuale

Confezionamento: Da confermare per il lotto attuale

Prezzo su richiesta

[Visualizza il prodotto online](#)

Descrizione

NUFERTO NPK 059 - Concimi composti.

Quando scegli un prodotto, valuta insieme composizione, condizioni d'impiego ed etichetta attuale.

Informazioni tecniche

Composizione garantita	% W/W
Azoto totale (N):	3
Azoto ureico (NH ₂ -N):	3
Pentossido di fosforo totale (P ₂ O ₅):	42
Contenuto di cloruri (Cl):	0,21
Densità:	1,4 gr/cc

Coltura	Per via fogliare	Al suolo - Irrigazione a goccia
Ortaggi (Cetriolo, Peperone, Melanzana, Zucchini, Fagiolo, Pisello, Pomodoro)	1. Dopo la raccolta. 2. Durante la fioritura: 100 cc/100 lt d'acqua. Al trapianto, immergere le radici delle piantine in una soluzione di Phyto-Fos preparata a 3 cc/lt.	Ripetere ogni 15 giorni: 500 cc/ da.
Barbabietola	Prima della fioritura: 100 cc / 100 lt acqua Prima della fioritura: 100 cc / 100 lt. acqua	Ripetere ogni 15 giorni: 500 cc/ da. Durante lo sviluppo dei tuberi 3 applicazioni: 500 cc /da.
Melone, Anguria	Applicazione 1: Durante la formazione delle ramificazioni 2. Prima della fioritura: 100 cc / 100 lt. acqua	500 cc / da.

Coltura	Per via fogliare	Al suolo - Irrigazione a goccia
Cotone	Applicazione 1: Inizio della formazione dei bottoni fiorali del cotone 2. Prima della fioritura: 100 cc / da.	
Agrumi (Limone, Arancia, Mandarino) Alberi da frutto (Mela, Pera, Prugna, Albicocca, Pesca, Ciliegia, Amarena)	Ogni 15-20 giorni durante la crescita, a partire dalla fioritura: 75-100 cc /100 lt. acqua	Eseguire 3 applicazioni a fine marzo, luglio e settembre. Terreni calcarei: 500 cc/da. Terreni con tenore normale di calcare: 400 cc/da.
Vite	Applicazione 1: Inizio della crescita 2. Dopo la raccolta: 50-75 cc /100 lt. acqua	Due applicazioni; 1. Prima della fioritura: 500 cc/decare (1.000 m ²) 2. Dopo la raccolta: 500 cc/decare (1.000 m ²)
Tabacco	Applicazione 1: Allo stadio di piantina, 2. Dopo la prima sarchiatura: 100-150 cc/100 lt. acqua	
Banano	All'emissione dell'infiorescenza del banano: 100-150 cc / 100 lt acqua	All'emissione dell'infiorescenza del banano: 500 cc / da.
Fragola, Lampone	2-3 applicazioni dal trapianto e durante la crescita vegetativa: 100 cc / 100 lt. acqua	Due applicazioni; 1. Prima della fioritura: 500 cc/decare (1.000 m ²) 2. Dopo la raccolta: 500 cc/decare (1.000 m ²)
Frumento, Orzo, Riso, Avena	All'accestimento: 100 cc /da.	
Olivo, Nocciola, Noce, Pistacchio	Applicazione 1: Dopo la raccolta, 2. Durante la fioritura: 75-100 cc /100 lt. acqua	Due applicazioni; 1. Prima della fioritura: 500 cc/decare (1.000 m ²) 2. Dopo la raccolta: 500 cc/decare (1.000 m ²)

Disponibilità, confezionamento, prezzi e specifiche del lotto sono confermati nel preventivo. Seguire l'etichetta e le istruzioni aggiornate. Le immagini delle confezioni sono illustrative.

Contatti e ordini

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727