

NUFERTO NPK 056



SKU: SRC-7F35D287532C8E1E

Catégorie: Engrais composés

Formule: À confirmer pour le lot actuel

Conditionnement: À confirmer pour le lot actuel

Prix sur demande

[Consulter le produit en ligne](#)

Description

NUFERTO NPK 056 - Engrais composés.

Pour choisir un produit, examinez ensemble sa composition, les conditions d'application et l'étiquette actuelle.

Informations techniques

Composition garantie	% W/W
Azote total (N):	3
Azote uréique (N):	3
Oxyde de potassium soluble dans l'eau (K2O):	20
Composants supplémentaires	% W/W
Pentoxyde de phosphore soluble dans l'eau (P2O5):	27

Culture	Période d'application	Par voie foliaire	Au sol
Légumes	Lorsque la plante atteint 30-40 cm, À intervalles de 20 jours 2 applications	150-200 cc/100 lt.d'eau	1 lt/da.
Vigne	Application 1 : à la chute de 50 % des pétales. Application 2 : au stade des petites baies vertes. Application 3 : au stade des grosses baies vertes.	75-100 cc/100 lt.d'eau	1-1,5 lt/da.
Arbres fruitiers (Tropicaux, à noyau et à pépins)	2 applications à partir de la nouaison	200-250 cc/100 lt.d'eau	2 lt/da

Culture	Période d'application	Par voie foliaire	Au sol
Agrumes	3 applications en mars, juillet et septembre	50 cc/100 lt.d'eau	1 lt/da.
Fraise	Application 1: Lorsque les fruits commencent à rougir Application 2: 20 jours plus tard	30 cc/100lt.d'eau	0,5 lt /da
Bananier	Application 1: Avant la formation des grappes Application 2: Après la formation des grappes	75 cc/100 lt d'eau 150 cc/100 lt d'eau	1 lt/da 1,5-2 lt/da
Pomme de terre, Betterave sucrière	Application 1 : lorsque la plante atteint 15 cm, au début de la formation des tubercules. Application 2 : 20 jours après la première application. Application 3 : pendant le grossissement des fruits.	100 cc/100 lt.d'eau	Application 1: 1,5-2 lt/da. Application 2: 2,5-3 lt/da. Application 3: 1,5-2 lt/da.
Maïs, Tournesol	Lorsque la plante atteint 25-30 cm, À intervalles de 20 jours 3 applications	100 cc/100 lt.d'eau	Application 1: 1,5-2 lt/da. Application 2: 2-2,5 lt/da. Application 3: 1,5-2 lt/da.
Cotonnier, Soja, Arachide	Lorsque la plante atteint 15-20 cm À intervalles de 15-20 jours 3 applications	100 cc/100 lt.d'eau	Application 1: 1,5-2 lt/da. Application 2: 2-2,5 lt/da. Application 3: 1,5-2 lt/da.
Pistachier, Noisette	2 applications pendant le remplissage des fruits	100 cc/100lt.d'eau	1 Lt/da.
Céréales (Blé, Orge)	Application 1: Lorsque la plante atteint 30-40 cm Application 2: 15-20 jours plus tard	100 cc/100lt.d'eau	1 Lt/da.

Disponibilité, conditionnement, prix et caractéristiques du lot sont confirmés dans le devis. Suivez l'étiquette et les instructions actuelles. Les visuels d'emballage sont illustratifs.

Contact et commandes

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727