

# NUFERTO NPK 057



SKU: SRC-38FEB97310205ECC

Categoria: Concimi composti

Formula: Da confermare per il lotto attuale

Confezionamento: Da confermare per il lotto attuale

## Prezzo su richiesta

[Visualizza il prodotto online](#)

## Descrizione

NUFERTO NPK 057 - Concimi composti.

Quando scegli un prodotto, valuta insieme composizione, condizioni d'impiego ed etichetta attuale.

## Informazioni tecniche

| Composizione garantita                                                    | % W/W |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Azoto totale (N)                                                          | 9     |
| Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> -N):                                   | 4     |
| Azoto nitrico (NO <sub>3</sub> -N):                                       | 2     |
| Azoto ureico (Nh <sub>2</sub> -N):                                        | 3     |
| Pentossido di fosforo solubile in acqua (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ): | 18    |
| Ossido di potassio solubile in acqua (K <sub>2</sub> O):                  | 10    |
| Ossido di magnesio solubile in acqua (MgO):                               | 2     |
| Boro solubile in acqua (B):                                               | 1     |
| Ferro solubile in acqua (Fe):                                             | 3     |
| Manganese solubile in acqua (Mn):                                         | 1     |
| Molibdeno solubile in acqua (Mo):                                         | 0,04  |
| Zinco solubile in acqua (Zn):                                             | 2     |

| Coltura | Epoca d'impiego             | Per via fogliare       | Tramite irrigazione a goccia |
|---------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
| Agrumi  | Prima della fioritura; dopo | 100-150 g/ 100 L acqua | 0.5-1 kg/ da (Per 20-25      |

| Coltura                                 | Epoca d'impiego                                                                                                                         | Per via fogliare                                                                                        | Tramite irrigazione a goccia       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                         | l'apertura del 80% dei fiori;<br>dopo l'allegagione;<br>concimazione dopo la<br>raccolta.                                               | 150-200 g / 100 L acqua<br>150-200 g / 100 L acqua<br>100-150 g / 100 L acqua                           | alberi)                            |
| Alberi da frutto                        | Prima della fioritura; dopo<br>l'apertura del 80% dei fiori;<br>dopo l'allegagione;<br>concimazione dopo la<br>raccolta.                | 100-150 g/ 100 L acqua<br>150-200 g / 100 L acqua<br>150-200 g / 100 L acqua<br>100-150 g / 100 L acqua | 0.5-1 kg/ da (Per 20-25<br>alberi) |
| Banano                                  | Prima dell'emissione<br>dell'infiorescenza del<br>banano Dopo l'emissione<br>dell'infiorescenza del<br>banano                           | 200 g/100 L acqua 250<br>g/100 L acqua (Sistema di<br>irrigazione a pioggia)                            |                                    |
| Vite                                    | Prima della ritenzione dei<br>fiori All'allegagione 1 mesi<br>prima della raccolta                                                      | 50-75 g / 100 L acqua 50-75<br>g / 100 L acqua 50-75 g/<br>100 L acqua                                  | 0.5-1 kg/ da                       |
| Pistacchio                              | Dopo la formazione delle<br>foglie Quando gli acini<br>hanno le dimensioni di un<br>chicco di grano<br>Concimazione dopo la<br>raccolta | 75-100 g / 100 L acqua<br>75-100 g / 100 L acqua<br>75-100 g / 100 L acqua                              | 1 kg/ da (Per 20-25 alberi)        |
| Mais, Girasole                          | Quando la pianta è alta 45<br>cm (All'ultimo passaggio del<br>trattore)                                                                 | 75-100 g / da                                                                                           |                                    |
| Cotone                                  | Prima della fioritura Inizio<br>della formazione dei bottoni<br>fiorali del cotone 45 giorni<br>prima della raccolta                    | 75-100 g / da 75-100 g / da<br>75-100 g / da                                                            |                                    |
| Olivo                                   | Durante la fioritura Alle<br>dimensioni di un cece 45<br>giorni prima della raccolta                                                    | 50-75 g/100 L acqua 50-75<br>g/100 L acqua 50-75 g/100<br>L acqua                                       | 1 kg/ da (Per 20-25 alberi)        |
| Cavolo, Cavolfiore, Pisello,<br>Fagiolo | 2 applicazioni: Allo stadio di<br>4-6 foglie e Dopo 20 giorni<br>2. Applicazione                                                        | 50-75 g/ 100 L acqua                                                                                    | 1 kg/ da.                          |
| Barbabietola da zucchero                | Applicazione 1: Dopo la<br>sarchiatura 2.Dopo la<br>sarchiatura                                                                         | 100-150 g/da                                                                                            |                                    |
| Cipolla, Aglio                          | Durante la sarchiatura<br>Stadio di 4-6 foglie Agli<br>stadi di dimensione di una<br>nocciola e di una noce                             | 100 g/ 100 L acqua 100 g/<br>100 L acqua 150 g /100 L<br>acqua                                          | 1 kg/ da.                          |

| Coltura                                                          | Epoca d'impiego                                                                                    | Per via fogliare          | Tramite irrigazione a goccia |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Cereali (Frumento, Orzo, Avena, Segale, Riso, Cece, Lenticchia)  | Applicazione 1: Quando la pianta è alta 10 cm 2.<br>Applicazione: Quando la pianta è alta 30-40 cm | 50-100 g/ da 50-100 g/ da |                              |
| Ortaggi (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchini ecc.) | Può essere applicato ogni 20 giorni per tutta la stagione                                          | 100-200 g / 100 L acqua   | 0.5-1 kg / da.               |

Disponibilità, confezionamento, prezzi e specifiche del lotto sono confermati nel preventivo. Seguire l'etichetta e le istruzioni aggiornate. Le immagini delle confezioni sono illustrative.

## Contatti e ordini

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727