

NUFERTO NPK 057



SKU: SRC-38FEB97310205ECC

Kategoria: Nawozy wieloskładnikowe

Formuła: Potwierdź dla aktualnej partii

Opakowanie: Potwierdź dla aktualnej partii

Cena na zapytanie

[Zobacz produkt online](#)

Opis

NUFERTO NPK 057 - Nawozy wieloskładnikowe.

Przy wyborze produktu uwzględnij łącznie skład, warunki stosowania i aktualną etykietę.

Informacje techniczne

Gwarantowany skład	% W/W
Azot całkowity (N)	9
Azot amonowy (NH ₄ -N):	4
Azot azotanowy (NO ₃ -N):	2
Azot amidowy (Nh ₂ -N):	3
Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅):	18
Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O):	10
Tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie (MgO):	2
Bor rozpuszczalny w wodzie (B):	1
Żelazo rozpuszczalne w wodzie (Fe):	3
Mangan rozpuszczalny w wodzie (Mn):	1
Molibden rozpuszczalny w wodzie (Mo):	0,04
Cynk rozpuszczalny w wodzie (Zn):	2

Roślina	Termin stosowania	Dolistnie	Przez nawadnianie kropłowe
Cytrusy	Przed kwitnieniem; po otwarciu 80% kwiatów; po zawiązaniu owoców; nawożenie po zbiorach.	100-150 g/ 100 L wody 150-200 g / 100 L wody 150-200 g / 100 L wody 100-150 g / 100 L wody	0.5-1 kg/ da (Na 20-25 drzew)
Drzewa owocowe	Przed kwitnieniem; po otwarciu 80% kwiatów; po zawiązaniu owoców; nawożenie po zbiorach.	100-150 g/ 100 L wody 150-200 g / 100 L wody 150-200 g / 100 L wody 100-150 g / 100 L wody	0.5-1 kg/ da (Na 20-25 drzew)
Banan	Przed pojawieniem się kwiatostanu banana Po pojawieniu się kwiatostanu banana	200 g/100 L wody 250 g/100 L wody (System deszczowania)	
Winorośl	Przed utrzymaniem zawiązków kwiatowych Przy zawiązywaniu owoców 1 miesiąc przed zbiorem	50-75 g / 100 L wody 50-75 g / 100 L wody 50-75 g/ 100 L wody	0.5-1 kg/ da
Pistacja	Po uformowaniu liści Gdy jagody mają wielkość ziarna pszenicy Nawożenie po zbiorach	75-100 g / 100 L wody 75-100 g / 100 L wody 75-100 g / 100 L wody	1 kg/ da (Na 20-25 drzew)
Kukurydza, Słonecznik	Gdy roślina ma wysokość 45 cm (Podczas ostatniego przejazdu ciągnika)	75-100 g / da	
Bawełna	Przed kwitnieniem Początek tworzenia pąków kwiatowych bawełny 45 dni przed zbiorem	75-100 g / da 75-100 g / da 75-100 g / da	
Oliwka	Podczas kwitnienia Przy wielkości ziarna ciecierzycy 45 dni przed zbiorem	50-75 g/100 L wody 50-75 g/100 L wody 50-75 g/100 L wody	1 kg/ da (Na 20-25 drzew)
Kapusta, Kalafior, Groch, Fasola	2 zabiegów: W fazie 4-6 liści i Po 20 dniach 2. Zastosowanie	50-75 g/ 100 L wody	1 kg/ da.
Burak cukrowy	Zabieg 1: Po pieleniu mechanicznym 2.Po pieleniu mechanicznym	100-150 g/da	
Cebula, Czosnek	W okresie pielenia mechanicznego Faza 4-6 liści W fazach wielkości orzecha laskowego i włoskiego	100 g/ 100 L wody 100 g/ 100 L wody 150 g /100 L wody	1 kg/ da.

Roślina	Termin stosowania	Dolistnie	Przez nawadnianie kroplowe
Zboża (Pszenica, Jęczmień, Owies, Żyto, Ryż, Ciecierzycy, Soczewica)	Zabieg 1: Gdy roślina ma wysokość 10 cm 2. Zastosowanie: Gdy roślina ma wysokość 30-40 cm	50-100 g/ da 50-100 g/ da	
Warzywa (Pomidor, Papryka, Bakłażan, Ogórek, Cukinia itp.)	Można stosować co 20 dni przez cały sezon	100-200 g / 100 L wody	0.5-1 kg / da.

Dostępność, opakowanie, ceny i parametry partii są potwierdzane w ofercie. Stosuj aktualną etykietę i instrukcje. Grafiki opakowań mają charakter poglądowy.

Kontakt i zamówienia

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727