

NUFERTO NPK 057



SKU: SRC-38FEB97310205ECC

Categorie: Îngrășăminte complexe

Formulă: Confirmați pentru lotul actual

Ambalaj: Confirmați pentru lotul actual

Preț la cerere

[Vezi produsul online](#)

Descriere

NUFERTO NPK 057 - Îngrășăminte complexe.

La alegerea produsului, analizați împreună compoziția, condițiile de aplicare și eticheta actuală.

Informații tehnice

Conținut garantat	% W/W
Azot total (N)	9
Azot amoniacal (NH ₄ -N):	4
Azot nitric (NO ₃ -N):	2
Azot ureic (Nh ₂ -N):	3
Pentaoxid de fosfor solubil în apă (P ₂ O ₅):	18
Oxid de potasiu solubil în apă (K ₂ O):	10
Oxid de magneziu solubil în apă (MgO):	2
Bor solubil în apă (B):	1
Fier solubil în apă (Fe):	3
Mangan solubil în apă (Mn):	1
Molibden solubil în apă (Mo):	0,04
Zinc solubil în apă (Zn):	2

Cultură	Moment de aplicare	Foliar	Prin picurare
Citrice	Înainte de înflorire; după	100-150 g/ 100 L apă	0.5-1 kg/ da (Pentru 20-25

Cultură	Moment de aplicare	Foliar	Prin picurare
	deschiderea a 80% din flori; după legarea fructelor; fertilizare după recoltare.	150-200 g / 100 L apă 150-200 g / 100 L apă 100-150 g / 100 L apă	pomi)
Pomi fructiferi	Înainte de înflorire; după deschiderea a 80% din flori; după legarea fructelor; fertilizare după recoltare.	100-150 g/ 100 L apă 150-200 g / 100 L apă 150-200 g / 100 L apă 100-150 g / 100 L apă	0.5-1 kg/ da (Pentru 20-25 pomi)
Bananier	Înainte de apariția inflorescenței bananierului După apariția inflorescenței bananierului	200 g/100 L apă 250 g/100 L apă (Sistem de aspersiune)	
Viță-de-vie	Înainte de fixarea florilor La legarea fructelor Cu 1 luni înainte de recoltare	50-75 g / 100 L apă 50-75 g / 100 L apă 50-75 g/ 100 L apă	0.5-1 kg/ da
Fistic	După formarea frunzelor Când boabele au mărimea unui bob de grâu Fertilizare după recoltare	75-100 g / 100 L apă 75-100 g / 100 L apă 75-100 g / 100 L apă	1 kg/ da (Pentru 20-25 pomi)
Porumb, Floarea-soarelui	Când planta are înălțimea de 45 cm (La ultima trecere a tractorului)	75-100 g / da	
Bumbac	Înainte de înflorire Începutul formării bobocilor la bumbac Cu 45 zile înainte de recoltare	75-100 g / da 75-100 g / da 75-100 g / da	
Măslin	În perioada de înflorire La mărimea unui bob de năut Cu 45 zile înainte de recoltare	50-75 g/100 L apă 50-75 g/100 L apă 50-75 g/100 L apă	1 kg/ da (Pentru 20-25 pomi)
Varză, Conopidă, Mazăre, Fasole	2 aplicări: În stadiul de 4-6 frunze și După 20 zile 2. Aplicare	50-75 g/ 100 L apă	1 kg/ da.
Sfeclă de zahăr	Aplicarea 1: După prășit 2.După prășit	100-150 g/da	
Ceapă, Usturoi	În perioada prășitului Stadiul de 4-6 frunze În stadiile de mărimea unei alune și a unei nuci	100 g/ 100 L apă 100 g/ 100 L apă 150 g /100 L apă	1 kg/ da.
Cereale (Grâu, Orz, Ovăz, Secară, Orez, Năut, Linte)	Aplicarea 1: Când planta are înălțimea de 10 cm 2. Aplicare: Când planta are înălțimea de 30-40 cm	50-100 g/ da 50-100 g/ da	

Cultură	Moment de aplicare	Foliar	Prin picurare
Legume (Tomate, Ardei, Vinete, Castraveți, Dovlecel etc.)	Poate fi aplicat la fiecare 20 zile pe tot sezonul	100-200 g / 100 L apă	0.5-1 kg / da.

Disponibilitatea, ambalajul, prețurile și specificațiile lotului se confirmă în ofertă. Respectați eticheta și instrucțiunile actuale. Imaginile ambalajelor sunt ilustrative.

Contact și comenzi

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727