

NUFERTO Amino 026



SKU: SRC-8D3F6F70C516D16A

Categoria: Amminoacidi

Formula: Da confermare per il lotto attuale

Confezionamento: Da confermare per il lotto attuale

Prezzo su richiesta

[Visualizza il prodotto online](#)

Descrizione

NUFERTO Amino 026 - Amminoacidi.

Quando scegli un prodotto, valuta insieme composizione, condizioni d'impiego ed etichetta attuale.

Informazioni tecniche

Composizione garantita	% W/W
Ossido di calcio solubile in acqua (CaO):	12,5

Coltura	Periodo d'uso	Irrigazione a goccia	Per via fogliare
Orticoltura (Serra) (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Melone, Anguria, Cipolla, Fragola, Fagiolo)	1 settimane dopo il trapianto Alla prima fioritura Dopo la prima cascola dei frutti Dopo la prima raccolta	1500-2000 cc/ da 1500-2000 cc/ da 1500-2000 cc/ da 1500-2000 cc/ da	100 cc/100lt acqua 150 cc/100lt acqua 150 cc/100lt acqua 100 cc/100lt acqua
Sugli ortaggi in pieno campo (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Melone, Anguria, Cipolla, Fragola, Fagiolo)	1 settimane dopo la fioritura Alla prima fioritura Dopo la prima cascola dei frutti Dopo la prima raccolta	1500-2000 cc/ da 1500-2000 cc/ da 1500-2000 cc/ da 1500-2000 cc/ da	150 cc/100lt acqua 200 cc/100lt acqua 200 cc/100lt acqua 150 cc/100lt acqua
Agrumi, Banano e Olivo	All'inizio della fioritura 15 giorni dopo la cascola dei frutti 20 giorni prima della raccolta	1500-2000 cc/ da 1500-2000 cc/ da 1500-2000 cc/ da	200 cc/100lt acqua 200 cc/100lt acqua 200 cc/100lt acqua
Sugli alberi da frutto (Mela, Pera, Albicocca, Cotogno, Ciliegia, Pesca, Noce)	All'inizio della fioritura 15 giorni dopo la cascola dei frutti 20 giorni prima della raccolta	1500-2000 cc/ da 1500-2000 cc/ da 1500-2000 cc/ da	100 cc/100lt acqua 150 cc/100lt acqua 150 cc/100lt acqua

Coltura	Periodo d'uso	Irrigazione a goccia	Per via fogliare
Colture da pieno campo (Soia, Orzo, Frumento, Cece, Lenticchia)	Quando le piante raggiungono 20-25 cm Allo stadio di maturazione lattea	1500-2000 cc/ da 1500-2000 cc/ da	200 cc/ da 250 cc/ da
Colture industriali (Mais, Patata, Barbabietola da zucchero)	Quando le piante hanno 3-5 foglie 10 giorni dopo la formazione della radice tuberizzata 20 giorni dopo la seconda concimazione	1500-2000 cc/ da 1500-2000 cc/ da 1500-2000 cc/ da	200 cc/100lt acqua 250 cc/100lt acqua 200 cc/100lt acqua

Disponibilità, confezionamento, prezzi e specifiche del lotto sono confermati nel preventivo. Seguire l'etichetta e le istruzioni aggiornate. Le immagini delle confezioni sono illustrative.

Contatti e ordini

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727