

NUFERTO Amino 012



SKU: SRC-CB3EB8B9FB85E63A

类别: 氨基酸

配方: 请确认当前批次

包装: 请确认当前批次

价格请咨询

[在线查看产品](#)

说明

NUFERTO Amino 012 - 植物营养产品。请联系我们了解包装、库存和报价。使用前请确认最新产品标签、使用说明及批次分析。

技术资料

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(W/W)
ORGANİK MADDE	%20
ORGANİK KARBON	%10
ORGANİK AZOT (N)	%2
SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT (K ₂ O)	%1
SERBEST AMİNO ASİTLER	%6
pH	3,5 - 5,5
AMBALAJ TİPİ	BİDON

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
SEBZELER	Domates, biber, patlıcan	Yapraktan	400 - 500 cc/100 lt	Dikimden 2 hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasada 10 gün kalana kadar sürdürülür.
Hıyar, kabak vb.	Topraktan	3 - 5 kg/da	Dikim döneminden itibaren 7 - 15 günlük periyotlarla hasat sonuna kadar uygulama yapılır.	

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
Marul, lahanagiller, roka, tere, maydanoz vb.	Yapraktan	300 - 400 cc/100 lt	Dikimden 1 hafta sonra başlatılan ilk uygulama, hasat sonuna 10 gün kalana kadar 4 - 5 defa yenilenir.	
Topraktan	2 - 4 kg/da	Dikimden 1 hafta sonra ilk uygulama yapılır. Hasat dönemine kadar 10 - 15 günde bir uygulama yapılır.		
MEYVE AĞAÇLARI	Turuncgiller (limon, altın top, portakal, mandalina, turunç, bergamut vb.)	Yapraktan	400 cc/100 lt	Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğini %80 - 90'ına ulaşıncaya kadar uygulama yapılır.
Topraktan	15 - 20 kg/da	Sürgün atımı ve çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı andan itibaren uygulamaya başlanır ve hasat dönemine kadar devam edilir.		
Elma, armut, fındık, kiraz, vişne, erik, şeftali, kayısı, ayva, nar, çilek, zeytin vb.	Yapraktan	300 cc/100 lt	Yapraklanma başlangıcından hasat dönemine 15 - 20 gün kalana kadar uygulama yapılır.	
Topraktan	25 kg/da	ilk sulama ile başlanır, hasat dönemine kadar 15 - 20 günde bir uygulama yapılır.		
TARLA BİTKİLERİ	Tahıllar, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, endüstri bitkileri, kavun, karpuz vb.	Yapraktan	1 kg/da	Yabancı ot ilacı ile karıştırılabilir. Yetiştirme dönemi boyunca 2 uygulama yapılabilir.
SÜS BİTKİLERİ	Kesme çiçek, salon bitkileri	Yapraktan	200 - 250 cc/100 lt	Yetiştirme dönemi boyunca, hasattan 20 gün önceye kadar uygulamaya devam edilir.
Topraktan	3 - 4 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca, haftada bir uygulama yapılır.		
Çim ve yeşil alanlar	Yağmurlama	1 - 3 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca, uygulama yapılır.	

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
BAĞ	Sofralık üzüm, kurutmalı k üzüm, şaraplık üzüm	Yapraktan	400 cc/100 lt	Yapraklanma başlangıcı ndan koruk dönemi sonu na kadar uygulama yapıl ır.
Topraktan	15 kg/da	Yapraklanma başlangıcı ndan hasat sonuna kada r istenilen aralıklarla uyg ulama yapılır.		
MUZ	Sera yetiştiriciliği ve açık ta yetiştiricilik.	Topraktan	15 - 20 kg/da	Yetiştirme dönemi boyun ca haftada bir uygulama yapılır.

供应、包装、价格和批次规格须在报价中确认。请遵循最新产品标签和使用说明。包装图片仅供示意。

联系与订购

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727