

NUFERTO Amino 014



SKU: SRC-BF8A38AFD71C8C2F

Kategori: Amino asitler

Formül: Güncel parti için teyit edin

Ambalaj: Güncel parti için teyit edin

Fiyat sorunuz

[Ürünü sitede inceleyin](#)

Açıklama

NUFERTO Amino 014 - Bitki besleme ürünü. Ambalaj seçenekleri, güncel stok ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin. Kullanımdan önce güncel ürün etiketi, uygulama talimatı ve parti analizini teyit edin.

Teknik bilgiler

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(W/W)
ORGANİK MADDE	%50
ORGANİK KARBON	%18
ORGANİK AZOT (N)	%7
SERBEST AMİNO ASİTLER	%14
pH	4,5 - 6,5
AMBALAJ TİPİ	BİDON

Bitki Adı	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama Dozu
Antepfıstığı	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde	250 ml / 100 l su
Armut	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 300 ml / 100 l su
Arpa	4 - 5 yapraklı dönemden kardeşlenme sonuna kadar ve kardeşlenmeden sonra 2 uygulama şeklinde	300 - 500 ml / da

Bitki Adı	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama Dozu
Ayçiçeği	3 - 4 gerçek yapraklı dönemde ve çiçeklenme öncesinde, 2 uygulama şeklinde	300 - 500 ml / da
Ayva	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 300 ml / 100 l su
Badem	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde	250 ml / 100 l su
Bağ	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde ve meyvelerin renk değişim döneminde	250 - 300 ml / 100 l su
Bezelye	Çiçeklenme öncesi; çiçeklenmeden sonra 10 - 15 gün aralıklarla 3 uygulama	200 - 300 ml / 100 l su
Biber (Tarla)	Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	250 - 300 ml / da
Biber (Sera)	Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	250 - 300 ml / 100 l su
Buğday	4 - 5 yapraklı dönemden kardeşlenme sonuna kadar ve kardeşlenmeden sonra 2 uygulama	300 - 500 ml / da
Ceviz	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde	250 ml / 100 l su
Çavdar	4 - 5 yapraklı dönemden kardeşlenme sonuna kadar ve kardeşlenmeden sonra, 2 uygulama şeklinde	300 - 500 ml / da
Çeltik	Kardeşlenme ve çiçeklenme dönemlerinde 2 uygulama	1. uyg: 400 - 500 ml / da 2. uyg: 500 - 600 ml / da
Çilek (Tarla)	Çiçeklenmeden 20 - 30 gün önce, meyve tutumundan 3 - 5 gün önce, üretim sezonu sonuna kadar 20 günde bir	200 - 250 ml / da
Çilek (Sera)	Kış dormansisinden önce, vegetatif gelişme başlangıcında, çiçeklenmeden 20 - 30 gün önce, meyve tutumundan 3 - 5 gün önce, üretim sezonu sonuna kadar 20 günde bir	200 - 250 ml / 100 l su

Bitki Adı	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama Dozu
Domates (Tarla)	Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	250 - 300 ml / da
Domates (Sera)	Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	250 - 300 ml / 100 l su
Elma	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 300 ml / 100 l su
Enginar	Dikimden 3 gün sonra ve 15 - 20 günde bir 4 uygulama	200 - 300 ml / 100 l su
Erik	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 250 ml / 100 l su
Fasulye	Çiçeklenme öncesi; çiçeklenmeden sonra 10 - 15 gün aralıklarla 3 uygulama	300 ml / 100 l su
Fındık	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde	250 ml / 100 l su
Greyfurt	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 300 ml / 100 l su
Havuç	Kökler kurşun kalem büyüklüğünü aldığı anda 2 - 3 haftada bir 3 - 4 uygulama	300 - 400 ml / da
Hıyar (Tarla)	Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	300 ml / da
Hıyar (Sera)	Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	100 - 250 ml / 100 l su
Ispanak	Ekimden 15 - 20 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama	250 ml / da
Kabak (Tarla)	4 - 5 yapraklı; çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	300 ml / da
Kabak (Sera)	4 - 5 yapraklı; çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	100 - 250 ml / 100 l su

Bitki Adı	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama Dozu
Karpuz (Tarla)	4 - 5 yapraklı; çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	300 ml / da
Karpuz (Sera)	4 - 5 yapraklı; çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	100 - 250 ml / 100 l su
Kavun (Tarla)	4 - 5 yapraklı; çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	300 ml / da
Kavun (Sera)	4 - 5 yapraklı; çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	100 - 250 ml / 100 l su
Kayısı	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; Meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 250 ml / 100 l su
Kereviz	Dikimden 10 - 15 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama	250 ml / da
Kestane	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde	250 ml / 100 l su
Kiraz	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; Meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 250 ml / 100 l su
Kivi	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi - Taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	150 - 200 ml / 100 l su 250 - 300 ml / 100 l su
Kolza	Yan dalların oluşumu ve gövdenin uzama dönemlerinde 2 uygulama	200 ml / da
Lahanagiller	Dikim sonrası ve 20 gün aralıkla iki uygulama	250 - 300 ml / da
Limon	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 300 ml / 100 l su
Mandalin	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 300 ml / 100 l su

Bitki Adı	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama Dozu
Marul (Tarla)	Şaşırtmadan 10 - 15 gün sonra 20 günde bir uygulama	250 ml / da
Marul (Sera)	Şaşırtmadan 10 - 15 gün sonra 20 günde bir uygulama	250 ml / 100 l su
Maydanoz	Kökler kurşun kalem büyüklüğünü aldığı anda 2 - 3 haftada bir 3 - 4 uygulama	250 - 300 ml / da
Mercimek	Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama	250 - 300 ml / da
Mısır	Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama	250 - 300 ml / da
Muz	Çiçeklenme meyve dökümü ve oluşumu, renk değişimi, don gibi kritik dönemlerde 12 - 14 gün aralıklarla 2 - 4 uygulama (1 - 2 yaşındaki genç bitkilerde düşük dozu kullanınız)	250 - 350 ml / da
Nar	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; Meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 250 ml / 100 l su
Nektarin	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; Meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 250 ml / 100 l su
Nohut	Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama	250 - 300 ml / da
Pamuk	3 - 4 yapraklı, çiçeklenmeden önce ve sonra 3 uygulama	200 - 300 ml / da
Patates	Bitkiler 15 cm olduğunda, yumrular fındık büyüklüğünü aldığı anda ve 15 gün sonra	200 - 300 ml / da
Patlıcan (Tarla)	Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	250 - 300 ml / da
Patlıcan (Sera)	Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde	250 - 300 ml / 100 l su
Pırasa	Dikimden 10 - 15 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama	250 ml / da
Bitki Adı	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama Dozu
Portakal	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme	200 - 300 ml / 100 l su

Bitki Adı	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama Dozu
	öncesi,taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	
Sarımsak	Yumruların oluşmaya başlamasından sonra her 20 günde bir; bakırlı bileşiklerle tank karışımı yapılabilir	200 - 300 ml / da
Soğan	Yumruların oluşmaya başlamasından sonra her 20 günde bir; bakırlı bileşiklerle tank karışımı yapılabilir	200 - 300 ml / da
Soya	Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama	250 - 300 ml / da
Şeftali	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; Meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 250 ml / 100 l su
Şekerpancarı	Ekimden 15 - 20 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama	250 ml / da
Tütün	Fide dikiminden 20 gün sonra başlayarak 15 gün aralıklarla 3 uygulama	200 - 250 ml / da
Vişne	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde; Meyveler 6 - 7 cm çaplı olduğunda	200 - 250 ml / 100 l su
Yerfıstığı	Ekimden 25 gün sonra, 15 gün arayla 3 uygulama	250 - 300 ml / da
Yulaf	4 - 5 yapraklı dönemden kardeşlenme sonuna kadar ve kardeşlenmeden sonra 2 uygulama	300 - 500 ml / da

Stok, ambalaj, fiyat ve parti özellikleri teklifte teyit edilir. Güncel ürün etiketi ve uygulama talimatlarını esas alın. Ambalaj görselleri temsildir.

İletişim ve sipariş

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727