

NUFERTO NPK 047 · 7-0-25



SKU: SRC-0D705065EEDBFF98

类别: 复合肥

配方: 请确认当前批次

包装: 请确认当前批次

价格请咨询

[在线查看产品](#)

说明

NUFERTO NPK 047 · 7-0-25 - 植物营养产品。请联系我们了解包装、库存和报价。使用前请确认最新产品标签、使用说明及批次分析。

技术资料

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(W/W)
TOPLAM AZOT (N)	%7
NİTRAT AZOTU (NO ₃ - N)	%7
SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT (K ₂ O)	%25
SUDA ÇÖZÜNÜR KALSİYUM OKSİT (CaO)	%2
SUDA ÇÖZÜNÜR MAGNEZYUM OKSİT (MgO)	%2
AMBALAJ TİPİ	18 KG KOVA

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
SEBZELER	Domates, biber, patlıcan , hıyar, kabak vb.	Yapraktan	200 - 300 cc/100 lt	Potasyum ihtiyacını karşılamak için gerektiği zaman 10 - 15 günde bir uygulama yapılır.
Topraktan	2 - 4 kg/da	Meyve oluşumu dönemi nden itibaren haftada bir uygulama yapılır.		

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
Marul, lahanagiller, roka, tere, maydanoz vb.	Yapraktan	100 - 200 cc/100 lt	Potasyum ihtiyacını karşılamak için gerektiği zaman	

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
			an 10 - 15 günde bir uygulama yapılır.	
Topraktan	1 - 2 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca haftada bir uygulama yapılır.		
MEYVE AĞAÇLARI	Turuncgiller (limon, altın top, portakal, mandalin, turunç, bergamut vb.)	Yapraktan	250 - 300 cc/100 lt	Meyve oluşum dönemin den sonra 10 - 15 gün aralıklarla uygulama yapılır.
Topraktan	15 kg/da	Çiçek dökümünün %70 - 80'i tamamlandıktan sonra 3 - 4 günde bir uygulama yapılır.		
Elma, armut, kiraz, vişne, erik, şeftali, kayısı, ayva, nar, fındık, zeytin vb.	Yapraktan	250 - 300 cc/100 lt	Meyve oluşum dönemin den sonra hasat dönemine kadar uygulama yapılır.	
Topraktan	15 kg/da	İlk sulama ile başlanır. Hasat dönemine kadar 3 - 4 günde bir uygulama yapılır.		
TARLA BİTKİLERİ	Tahıllar, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, endüstri bitkileri, kavun, karpuz vb.	Yapraktan	1 - 3 kg/da	Yabancı ot ilacı karıştırılabilir. Yetiştirme dönemi boyunca 2 uygulama yapılabilir.
SÜS BİTKİLERİ	Kesme çiçek, salon bitkileri	Yapraktan	200 - 300 cc/100 lt	Potasyum ihtiyacını karşılamak için gerektiği zaman 10 - 15 günde bir uygulama yapılır.
Topraktan	2 - 4 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca haftada bir uygulama yapılır.		
Çim ve yeşil alanlar	Yağmurlama	3 kg/da	Gelişim dönemi boyunca uygulama yapılabilir.	
BAĞ	Sofralık üzüm, kurutmalık üzüm, şaraplık üzüm	Yapraktan	200 - 400 cc/100 lt	Çiçeklenme sonrası döneminden hasat dönemine kadar 10 - 15 günde bir uygulama yapılır.
Topraktan	15 kg/da	Çiçeklenme sonrası, koruk ve aladüşme dönemlerinde 3 - 4 günde bir uygulama yapılır.		

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
MUZ	Sera yetiştiriciliği, açıkta yetiştiricilik.	Yapraktan	5 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca Potasyum ihtiyacını gidermek için haftada bir uygulama yapılır.
Topraktan				

供应、包装、价格和批次规格须在报价中确认。请遵循最新产品标签和使用说明。 包装图片仅供示意。

联系与订购

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727