

NUFERTO Amino 015



SKU: SRC-EEC1980D45D498A4

Kategorie: Aminosäuren

Formel: Aktuelle Charge bestätigen

Verpackung: Aktuelle Charge bestätigen

Preis auf Anfrage

[Produkt online ansehen](#)

Beschreibung

NUFERTO Amino 015 - Produkt für die Pflanzenernährung. Kontaktieren Sie uns zu Verpackung, Verfügbarkeit und Angebot. Aktuelles Etikett, Anwendungshinweise und Chargenanalyse vor Gebrauch prüfen.

Technische Angaben

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(W/W)
ORGANİK MADDE	%35
ORGANİK KARBON	%17
ORGANİK AZOT (N)	%2
SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT (K ₂ O)	%2,5
SERBEST AMİNO ASİTLER	%6
pH	3,3 - 5,3
AMBALAJ TİPİ	BİDON

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
SEBZELER	Domates, biber, patlıcan,	Yapraktan	400 - 500 cc/100 lt	Dikimden 2 hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasada 10 gün kalana kadar sürdürülür.

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
Hıyar, kabak vb.	Topraktan	3 - 5 kg/da	Dikim döneminden itibaren 7 - 15 günlük periyodlarla hasat	

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
			sonuna kadar uygulama yapılır.	
Marul, lahanagiller, roka, tere, maydanoz vb.	Yapraktan	300 - 400 cc/100 lt	Dikimden 1 hafta sonra başlatılan ilk uygulama, hasat sonuna 10 gün kalana kadar 4 - 5 defa yenilenir.	
Topraktan	2 - 4 kg/da	Dikimden 1 hafta sonra ilk uygulama yapılır. Hasat dönemine kadar 10 - 15 günde bir uygulama yapılır.		
MEYVE AĞAÇLARI	Turuncgiller (limon, altıntop, portakal, mandalina, turunç, bergamut vb.)	Yapraktan	400 cc/100 lt	Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğinin %80 - 90'ına ulaşıncaya kadar uygulama yapılır.
Topraktan	15 - 20 kg/da	Sürgün atımı ve çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı andan itibaren uygulamaya başlanır ve hasat dönemine kadar devam edilir.		
Elma, armut, fındık, kiraz, vişne, erik, şeftali, kayısı, ayva, nar, çilek, zeytin vb.	Yapraktan	300 cc/100 lt	Yapraklanma başlangıcından hasat dönemine 15 - 20 gün kalana kadar uygulama yapılır.	
Topraktan	25 kg/da	ilk sulama ile başlanır, hasat dönemine kadar 15 - 20 günde bir uygulama yapılır.		
TARLA BİTKİLERİ	Tahıllar, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, endüstri bitkileri, kavun, karpuz vb.	Yapraktan	1 kg/da	Yabancı ot ilacı ile karıştırılabilir. Yetiştirme dönemi boyunca 2 uygulama yapılabilir.
ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
SÜS BİTKİLERİ	Kesme çiçek, salon bitkileri	Yapraktan	200 - 250 cc/100 lt	Yetiştirme dönemi boyunca, hasattan 20

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
				gün önceye kadar uygulamaya devam edilir.
Topraktan	3 - 4 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca, haftada bir uygulama yapılır.		
Çim ve yeşil alanlar	Yağmurlama	1 - 3 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca, uygulama yapılır.	
BAĞ	Sofralık üzüm, kurutmalık üzüm, şaraplık üzüm	Yapraktan	400 cc/100 lt	Yapraklanma başlangıcından koruk dönemi sonuna kadar uygulama yapılır.
Topraktan	15 kg/da	Yapraklanma başlangıcından hasat sonuna kadar istenilen aralıklarla uygulama yapılır.		
MUZ	Sera yetiştiriciliği ve açıkta yetiştiricilik.	Topraktan	15 - 20 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca haftada bir uygulama yapılır.

Verfügbarkeit, Verpackung, Preise und Chargendaten sind im Angebot zu bestätigen. Aktuelles Etikett und Anwendungshinweise beachten. Verpackungsbilder dienen der Illustration.

Kontakt und Bestellung

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727