

NUFERTO NPK 049



SKU: SRC-7CD1BCDD9FD8692E

Kategori: Kompoze gübreler

Formül: Güncel parti için teyit edin

Ambalaj: Güncel parti için teyit edin

Fiyat sorunuz

[Ürünü sitede inceleyin](#)

Açıklama

NUFERTO NPK 049 - Bitki besleme ürünü. Ambalaj seçenekleri, güncel stok ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin. Kullanımdan önce güncel ürün etiketi, uygulama talimatı ve parti analizini teyit edin.

Teknik bilgiler

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(W/W)
ORGANİK MADDE	%25
TOPLAM AZOT (N)	%4
NİTRAT AZOTU (N)	%1,2
AMONYUM AZOTU (N)	%0,8
ÜRE AZOTU (N)	%1
ORGANİK AZOTU (N)	%1
SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT (K ₂ O)	%6
SUDA ÇÖZÜNÜR DEMİR (Fe)	%2
SUDA ÇÖZÜNÜR MANGAN (Mn)	%1
MAKSİMUM KLOR (Cl)	%1
pH	2,2 - 4,2
AMBALAJ TİPİ	BİDON

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
SEBZELER	Domates, biber,	Yapraktan	250 - 300 cc/100 lt	Dikimden 2 hafta

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
	patlıcan, hıyar, kabak vb.			sonra ilk uygulama yapılır ve hasada 10 gün kalana kadar sürdürülür.
Topraktan	2 - 4 kg/da	Dikim döneminden itibaren 7 - 15 günlük periyodlarla hasat sonuna kadar uygulama yapılır.		
Marul, lahanagiller, roka, tere, maydanoz vb.	Yapraktan	300 cc/100 lt	Dikimden 1 hafta sonra başlatılan ilk uygulama, hasat sonuna 10 gün kalana kadar 4 - 5 defa yenilenir.	
Topraktan	1 - 3 kg/da	Dikimden 1 hafta sonra ilk uygulama yapılır. Hasat dönemine kadar 10 - 15 günde bit uygulama yapılır.		
MEYVE AĞAÇLARI	Turuncgiller (limon, altıntop, portakal, mandalina, turunç, bergamut vb.)	Yapraktan	250 - 300 cc/100 lt	Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğinin %80 - 90'ına ulaşınca kadar uygulama yapılır.
Topraktan	10 - 15 kg/da	Sürgün atımı ve çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı andan itibaren uygulamaya başlanır ve hasat dönemine kadar devam edilir.		
Elma, armut, fındık, kiraz, vişne, erik, şeftali, kayısı, ayva, nar, çilek, zeytin vb.	Yapraktan	300 cc/100 lt	Yapraklanma başlangıcından hasat dönemine 15 - 20 gün kalana kadar uygulama yapılır.	
Topraktan	25 kg/da	İlk sulama ile başlanır, hasat dönemine kadar 15 - 20 günde bir uygulama yapılır.		

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
TARLA BİTKİLERİ	Tahıllar, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, endüstri bitkileri, kavun, karpuz vb.	Yapraktan	1 - 3 kg/da	Yabancı ot ilacı ile karıştırılabilir. Yetiştirme dönemi boyunca 2 uygulama yapılabilir.
SÜS BİTKİLERİ	Kesme çiçek, salon bitkileri	Yapraktan	200 - 250 cc/100 lt	Yetiştirme dönemi boyunca, hasattan 20 gün önceye kadar uygulamaya devam edilir.
Topraktan	2 - 4 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca, haftada bir uygulama yapılır.		
Çim ve yeşil alanlar	Yağmurlama	1 - 3 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca, uygulama yapılır.	
BAĞ	Sofralık üzüm, kurutmalık üzüm, şaraplık üzüm	Yapraktan	300 cc/100 lt	Yapraklanma başlangıcından koruk dönemi sonuna kadar uygulama yapılır.
Topraktan	25 kg/da	Yapraklanma başlangıcından hasat sonuna kadar istenilen aralıklarla uygulama yapılır.		
MUZ	Sera yetiştiriciliği ve açıkta yetiştiricilik.	Topraktan	10 - 15 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca haftada bir uygulama yapılır.

Stok, ambalaj, fiyat ve parti özellikleri teklifte teyit edilir. Güncel ürün etiketi ve uygulama talimatlarını esas alın. Ambalaj görselleri temsildir.

İletişim ve sipariş

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727