

NUFERTO Amino 010



SKU: SRC-E254424B7B26AB20

Категория: Аминокиселини

Формула: Потвърдете за текущата партида

Опаковка: Потвърдете за текущата партида

Цена при запитване

[Вижте продукта онлайн](#)

Описание

NUFERTO Amino 010 - Продукт за хранене на растенията. Свържете се с нас за опаковка, наличност и оферта. Преди употреба проверете актуалния етикет, указанията и анализа на партидата.

Технически данни

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(W/W)
ORGANİK MADDE	%30
SUDA ÇÖZÜNÜR BOR (B)	0,5
SUDA ÇÖZÜNÜR MANGAN (Mn)	%1,1
SUDA ÇÖZÜNÜR ÇİNKO (Zn)	%0,9
MAKSİMUM KLOR (Cl)	%0,8
SERBEST AMİNOASİTLER	%2,5
pH	2,9 - 4,9
AMBALAJ TİPİ	BİDON

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
SEBZELER	Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak vb.	Yapraktan	400 - 500 cc/100 lt	Dikimden 2 hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasada 10 gün kalana kadar sürdürülür.
ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
Topraktan	3 - 5 kg/da	Dikimden		

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
		döneminden itibaren 7 - 15 günlük periyodlarla hasat sonuna kadar uygulama yapılır.		
Marul, lahanagiller, roka, tere, maydanoz vb.	Yapraktan	300 - 400 cc/100 lt	Dikimden 1 hafta sonra başlatılan ilk uygulama, hasat sonuna 10 gün kalana kadar 4 - 5 defa yenilenir.	
Topraktan	2 - 4 kg/da	Dikimden 1 hafta sonra ilk uygulama yapılır. Hasat dönemine kadar 10 - 15 günde bir uygulama yapılır.		
MEYVE AĞAÇLARI	Turuncgiller (limon, altıntop, portakal, mandalina, turunç, bergamut vb.)	Yapraktan	400 cc/100 lt	Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğinin %80 - 90'ına ulaşıncaya kadar uygulama yapılır.
Topraktan	15 - 20 kg/da	Sürgün atımı ve çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı andan itibaren uygulamaya başlanır ve hasat dönemine kadar devam edilir.		
Elma, armut, fındık, kiraz, vişne, erik, şeftali, kayısı, ayva, nar, çilek, zeytin vb.	Yapraktan	300 cc/100 lt	Yapraklanma başlangıcından hasat dönemine 15 - 20 gün kalana kadar uygulama yapılır.	
Topraktan	15 - 20 kg/da	İlk sulama ile başlanır, hasat dönemine kadar 15 - 20 günde bir uygulama yapılır.		
TARLA BİTKİLERİ	Tahıllar, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, endüstri bitkileri, kavun, karpuz vb.	Yapraktan	250 - 400 cc/100 lt	Yabancı ot ilacı ile karıştırılabilir. Yetiştirme dönemi boyunca 2 kez uygulanabilir.

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
Topraktan	1 - 3 kg/da	Her sulama suyu ile birlikte uygulanabilir.		
SÜS BİTKİLERİ	Kesme çiçek, salon bitkileri	Yapraktan	200 - 250 cc/100 lt	Yetiştirme dönemi boyunca, hasattan 20 gün önceye kadar uygulamaya devam edilir.
Çim ve yeşil alanlar	Topraktan	3 - 4 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca haftada 1 hafta uygulama yapılır.	
BAĞ	Sofralık üzüm, kurutmalık üzüm, şaraplık üzüm	Yapraktan	400 cc/100 lt	Yapraklanma başlangıcından koruk dönemi sonuna kadar uygulama yapılır.
Topraktan	15 kg/da	Yapraklanma başlangıcından hasat sonuna kadar istenilen aralıklarla uygulama yapılır.		
MUZ	Sera yetiştiriciliği ve açıkta yetiştiricilik.	Topraktan	15 - 20 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca haftada 1 uygulama yapılır.

Наличност, опаковка, цени и партидни данни се потвърждават в офертата. Следвайте актуалния етикет и указанията. Изображенията на опаковката са илюстративни.

Контакт и поръчки

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727