

NUFERTO NPK 046



SKU: SRC-688299CACD4C7156

Category: Compound fertilizers

Formula: Confirm for current batch

Packaging: Confirm for current batch

Price on request[View product online](#)

Description

NUFERTO NPK 046 - Plant nutrition product. Contact us for packaging options, availability and a quotation. Confirm the current product label, application instructions and batch specification before use.

Technical information

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(W/W)
ORGANİK MADDE	%35
ORGANİK AZOT (N)	%3
NİTRAT AZOTU (N)	%3
SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT (K ₂ O)	%13
MAKSİMUM KLOR (Cl)	%9
PH	1 - 3
AMBALAJ TİPİ	15 KG KOVA

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
SEBZELER	Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak vb.	Yapraktan	200 - 300 cc/100 lt	Potasyum ihtiyacını karşılamak için gerektiği zaman 10 - 15 günde bir uygulama yapılır.
Topraktan	2 - 4 kg/da	Meyve oluşumu döneminden itibaren haftada bir uygulama yapılır.		

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
Marul, lahanagiller, roka, tere, maydanoz vb.	Yapraktan	100 - 200 cc/100 lt	Potasyum ihtiyacını karşılamak için gerektiği zaman 10 - 15 günde bir uygulama yapılır.	
Topraktan	1 - 2 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca haftada bir uygulama yapılır.		
MEYVE AĞAÇLARI	Turuncgiller (limon, altıntop, portakal, mandalin, turunç, bergamut vb.)	Yapraktan	250 - 300 cc/100 lt	Meyve oluşum döneminden sonra 10 - 15 gün aralıklarla uygulama yapılır.
Topraktan	15 kg/da	Çiçek dökümünün %70 - 80'i tamamlandıktan sonra 3 - 4 günde bir uygulama yapılır.		
Elma, armut, kiraz, vişne, erik, şeftali, kayısı, ayva, nar, fındık, zeytin vb.	Yapraktan	250 - 300 cc/100 lt	Meyve oluşum döneminden sonra hasat dönemine kadar uygulama yapılır.	
Topraktan	15 kg/da	İlk sulama ile başlanır. Hasat dönemine kadar 3 - 4 günde bir uygulama yapılır.		
TARLA BİTKİLERİ	Tahıllar, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, endüstri bitkileri, kavun, karpuz vb.	Yapraktan	1 - 3 kg/da	Yabancı ot ilacı karıştırılabilir. Yetiştirme dönemi boyunca 2 uygulama yapılabilir.
SÜS BİTKİLERİ	Kesme çiçek, salon bitkileri	Yapraktan	200 - 300 cc/100 lt	Potasyum ihtiyacını karşılamak için gerektiği zaman 10 - 15 günde bir uygulama yapılır.
Topraktan	2 - 4 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca haftada bir uygulama yapılır.		
Çim ve yeşil alanlar	Yağmurlama	3 kg/da	Gelişim dönemi boyunca uygulama yapılabilir.	

ÜRÜN	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZAJI	UYGULAMA ZAMANI	
BAĞ	Sofralık üzüm, kurutmalık üzüm, şaraplık üzüm	Yapraktan	200 - 400 cc/100 lt	Çiçeklenme sonrası döneminden hasat dönemine kadar 10 - 15 günde bir uygulama yapılır.
Topraktan	15 kg/da	Çiçeklenme sonrası, koruk ve ala düşme dönemlerinde 3 - 4 günde bir uygulama yapılır.		
MUZ	Sera yetiştiriciliği, açıkta yetiştiricilik.	Yapraktan	5 kg/da	Yetiştirme dönemi boyunca Potasyum ihtiyacını gidermek için haftada bir uygulama yapılır.
Topraktan				

Availability, packaging, prices and batch specifications require quotation confirmation. Follow the current product label and application instructions. Packaging visuals are illustrative.

Contact & orders

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727