

NUFERTO Nutrient 069



SKU: SRC-5452F86CBCE35692

Категория: Другие средства питания растений

Формула: Уточните для текущей партии

Упаковка: Уточните для текущей партии

Цена по запросу

[Открыть товар на сайте](#)

Описание

NUFERTO Nutrient 069 - Продукт для питания растений. Свяжитесь с нами для уточнения упаковки, наличия и стоимости. Перед применением проверьте актуальную этикетку, инструкцию и анализ партии.

Технические данные

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Toplam Organik Madde:	24
Organik Karbon:	9
Toplam Azot (N):	1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):	1
pH Aralığı:	4-6

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN (Damlama sulama)
Tüm Sera Sebzeçiliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık,Fasulye, Çilek, Muz, v.s)	Yapraktan: Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile hasat sonuna kadar uygulanır. Damlama Sulama: 1.Uygulama dikimden 10-15 gün sonra köklenme döneminde 2. Uygulama sezon ortasında	200-250 cc/100 lt su	1 - 1,5 lt /da.

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN (Damlama sulama)
Tüm Açık Alan Sebzeçiliği	Yapraktan: Dikimden 20	200-250 cc/100 lt su	1,5 - 2 lt /da.

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN (Damlama sulama)
(Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasülye, Çay, Çilek, v.s)	gün sonra 10 gün ara ile hasat sonuna kadar uygulanır.		
Tüm Yaprığı Yenen Sebzeler (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Kivırcık, Aysberg, v.s)	Yapraktan: Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile hasat sonuna kadar uygulanır. Damlama Sulama: 1.Uygulama dikimden 10-15 gün sonra köklenme döneminde 2. Uygulama sezon ortasında	200-250 cc/100 lt su	1 - 1,5 lt /da.
Kavun, Karpuz, Kabak, Turp, Soğan, Havuç, Patates vs.	Yapraktan: Dikimden 20 gün sonra 10 gün ara ile hasat sonuna kadar uygulanır. Damlama Sulama: 1.Uygulama dikimden 10-15 gün sonra köklenme döneminde 2. Uygulama sezon ortasında	200-250 cc/100 lt su	1 - 1,5 lt /da.
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Bağ, Zeytin, Narenciye, v.s)	Üç uygulama tavsiye edilmektedir. 1.Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesinde 2.Meyve oluşumunda 3.Hasat sonuna kadar	200-250 cc/100 lt su	2 - 2,5 lt /da. veya ağaç başına 100 cc/100 lt su / Ağaç
Antep Fıstığı, Fındık, Badem, Ceviz	Dikiminden itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	200-250 cc/100 lt su	2 - 2,5 lt /da.
Tüm Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik, Nohut, Mercimek, v.s)	İki uygulama yapılır; 1.nci uygulama: Yabancı ot ilaçlarıyla birlikte 2.nci uygulama: kardeşlenme döneminde	200-250 cc/100 lt su	1 lt /da.
Tüm Endüstri Bitkileri (Şekerpancarı, Yerfıstığı, Mısır, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, v.s)	Bitkiler 5-10 cm boya ulaştıktan sonra, 20 gün arayla 2 uygulama yapılır.	200-250 cc/100 lt su	2 - 2,5 lt /da.
Kesme Çiçekçilik, Yeşil Alanlar	Dikiminden itibaren 15 gün ara ile hasat sonuna kadar 2 uygulama yapılır.	200-250 cc/100 lt su	2 - 2,5 lt /da.

Наличие, упаковка, цены и характеристики партии подтверждаются в предложении. Соблюдайте актуальную этикетку и инструкцию. Изображения упаковки являются иллюстративными.

Контакты и заказ

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: [+90 532 551 89 99](https://wa.me/905325518999)

Oman: [+965 9887 1727](https://wa.me/96598871727)