

NUFERTO Amino 025



SKU: SRC-D2D4DE52926B3998

Категория: Аминокиселини

Формула: Потвърдете за текущата партида

Опаковка: Потвърдете за текущата партида

Цена при запитване

[Вижте продукта онлайн](#)

Описание

NUFERTO Amino 025 - Продукт за хранене на растенията. Свържете се с нас за опаковка, наличност и оферта. Преди употреба проверете актуалния етикет, указанията и анализа на партидата.

Технически данни

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Toplam Organik Madde:	30
Organik Karbon:	12
Organik Azot (N):	2
Suda Çözünür Potasyum oksit (K ₂ O):	2
Serbest Amino Asitler:	6
pH:	4-6
Ürün etkinliğini artırmak için katkı maddeleri mevcuttur.	

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN UYGULAMA
Sera sebzeleri	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar	200-250 cc/100 lt.su	400-450 cc/da.
Açık alan sebzeleri	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar	250-300 cc/100 lt.su	450-500 cc/da.

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN UYGULAMA
Yaprağı yenen sebzeler	Gelişme dönemi boyunca	250-300 cc/100 lt.su	450-500 cc/da.
Şeker Pancarı	Ekimden sonra(çıkış öncesinde) yabancı ot ilacı ile birlikte	200-250 cc/100 lt.su	450-500 cc/da.
Havuç, Patates vb.	Dikimden yada ilk sürgünlerin çıkmasından 15-30-45-60 gün sonra uygulanır.	200-250 cc/100 lt.su	450-500 cc/da.
Yumuşak çekirdekli meyveler	Kök ve sürgün döneminin başladığı ilk bahar döneminde Gelişme dönemi boyunca	200-250 cc/100 lt.su	450-500 cc/da.
Sert çekirdekli meyveler	Kök ve sürgün döneminin başladığı ilk bahar döneminde Gelişme dönemi boyunca	200-250 cc/100 lt.su	450-500 cc/da.
Çilek, Muz	Fide dikiminden 10-15 gün sonra Çiçeklenme döneminden itibaren	200-250 cc/100 lt.su	400-450 cc/da.
Turuncgiller	Kök ve sürgün döneminin başladığı ilk bahar döneminde Gelişme dönemi boyunca	200-250 cc/100 lt.su	500-550 cc/da
Zeytin, Ceviz, Badem vb.	Kök ve sürgün döneminin başladığı ilk bahar döneminde Gelişme dönemi boyunca	150-200 cc/100 lt.su	250-300 cc/da.
Bağ	Kök ve sürgün döneminin başladığı ilk bahar döneminden hasada kadar. Hasat sonrası 15 gün arayla 2 uygulama	150-200 cc/100 lt.su	300-350 cc/da.
Tahıl, Hububat ve Endüstri Bitkileri	Kardeşlenme başlangıcında ve erken çiçek döneminde	300-350 cc/100 lt.su	350-400 cc/da

Наличност, опаковка, цени и партидни данни се потвърждават в офертата. Следвайте актуалния етикет и указанията. Изображенията на опаковката са илюстративни.

Контакт и поръчки

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727