

NUFERTO Micro 016

SKU: SRC-C2E3EC543D1145FA



الفئة: العناصر الصغرى
التركيبية: يرجى التأكد للدفعة الحالية
التعبئة: يرجى التأكد للدفعة الحالية

السعر عند الطلب

عرض المنتج على الموقع

الوصف

منتج لتغذية النبات. تواصل معنا لمعرفة خيارات التعبئة والتوفر وعرض السعر. تحقق من ملصق المنتج الحالي - NUFERTO Micro 016 وتعليمات الاستخدام وتحليل الدفعة قبل الاستعمال.

المعلومات الفنية

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Suda Çözünür Demir (Fe):	6
EDTA ile Şelatlı Demir (Fe):	6
Demin (Fe)'in Stabil pH aralığı:	3-11
Ürün etkinliğini artırmak için katkı maddeleri mevcuttur.	

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA SAYISI	YAPRAKTAN Gram/dekar (100 lt su ile)	DAMLA SULAMADAN Gram/dekar (1 ton su ile)
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz	Fide dikiminden itibaren, hasattan 15-20 gün öncesine kadar	Haftalık	75-100 gr/da.	200-250 gr/da.
Yaprağı Yeneni sebzeler Marul- Kıvırcık-Lahana vb.	5.nci yaprak açmadan önce başlayarak	Haftalık	75-100 gr/da.	200-250 gr/da.
Çilek	Meyvelerin kızarmaya başladığı gelişme döneminde, noksanlık görüldüğünde	Haftalık	75-100 gr/da.	150-200 gr/da.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA SAYISI	YAPRAKTAN Gram/dekar (100 lt su ile)	DAMLA SULAMADAN Gram/dekar (1 ton su ile)
Bağ, Kivi	Sürgün oluşumu başlangıcından itibaren	3-4 uygulama	75-100 gr/da.	100-150 gr/da.
Muz	1.Yeni sürgünde 2.Gelişme döneminde 3.Noksanlık görüldüğünde	3-4 uygulama	200-250 gr/da.	300-350 gr/da
Narenciye	1.Çiçeklenmeden 10-15 gün önce 2.Bir ay sonra 2. uygulama. 3.Gelişme döneminde 4.Noksanlık görüldüğünde	3-4 uygulama	100-150 gr/da.	200-250 gr/da.
Kiraz, Vişne, Şeftali, Kaysı, Erik, Elma, Armut, Zeytin, Antep fıstığı-Fındık-Ceviz	1.Sürgün faaliyeti başladıktan sonra, 2.Gelişme döneminde 3.Noksanlık görüldüğünde	3-4 uygulama	75-100 gr/da.	200-250 gr/da.
Pamuk	1.Taraklanma başlangıcında 2. Koza oluşumundan önce	2 uygulama	100 gr/da. 150 gr/da.	200-250 gr/da.
Mısır-Ayçiçeği- Buğday-Arpa-Çeltik	1.Kardeşlenme öncesinde 2.Sapa kalkma döneminde	2 uygulama	100 gr/da. 150 gr/da.	200-250 gr/da.
Patates-Şekerpancarı	Yumru irileşme döneminde	2 uygulama	75-100 gr/da.	200-250 gr/da.
Havuç-Soğan-Sarımsak	Bitkilerin 5-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren	2 uygulama	75-100 gr/da.	200-250 gr/da.
Yeşil alanlar-Kesme çiçekçilik	Gelişme döneminde, demir noksanlığı görüldüğünde	2-5 uygulama	100-150 gr/da	200-250 gr/da.
TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANIMI TAVSİYE EDİLİR.				

يتم تأكيد التوفر والتعبئة والأسعار ومواصفات الدفعة في عرض السعر. اتبع ملصق المنتج وتعليمات الاستخدام الحالية. صور العبوات توضيحية.

التواصل والطلبات

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727