

NUFERTO Micro 016



SKU: SRC-C2E3EC543D1145FA

Kategori: Mikro elementler

Formül: Güncel parti için teyit edin

Ambalaj: Güncel parti için teyit edin

Fiyat sorunuz

[Ürünü sitede inceleyin](#)

Açıklama

NUFERTO Micro 016 - Bitki besleme ürünü. Ambalaj seçenekleri, güncel stok ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin. Kullanımdan önce güncel ürün etiketi, uygulama talimatı ve parti analizini teyit edin.

Teknik bilgiler

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Suda Çözünür Demir (Fe):	6
EDTA ile Şelatlı Demir (Fe):	6
Demin (Fe)'in Stabil pH aralığı:	3-11
Ürün etkinliğini artırmak için katkı maddeleri mevcuttur.	

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA SAYISI	YAPRAKTAN Gram/dekar (100 lt su ile)	DAMLA SULAMADAN Gram/dekar (1 ton su ile)
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz	Fide dikiminden itibaren, hasattan 15-20 gün öncesine kadar	Haftalık	75-100 gr/da.	200-250 gr/da.
Yaprağı Yeneni sebzeler Marul- Kıvırcık-Lahana vb.	5.nci yaprak açmadan önce başlayarak	Haftalık	75-100 gr/da.	200-250 gr/da.
Çilek	Meyvelerin kızarmaya başladığı gelişme döneminde, noksanlık görüldüğünde	Haftalık	75-100 gr/da.	150-200 gr/da.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA SAYISI	YAPRAKTAN Gram/dekar (100 lt su ile)	DAMLA SULAMADAN Gram/dekar (1 ton su ile)
Bağ, Kivi	Sürgün oluşumu başlangıcından itibaren	3-4 uygulama	75-100 gr/da.	100-150 gr/da.
Muz	1.Yeni sürgünde 2.Gelişme döneminde 3.Noksanlık görüldüğünde	3-4 uygulama	200-250 gr/da.	300-350 gr/da
Narenciye	1.Çiçeklenmeden 10-15 gün önce 2.Bir ay sonra 2. uygulama. 3.Gelişme döneminde 4.Noksanlık görüldüğünde	3-4 uygulama	100-150 gr/da.	200-250 gr/da.
Kiraz, Vişne, Şeftali, Kaysı, Erik, Elma, Armut, Zeytin, Antep fıstığı-Fındık-Ceviz	1.Sürgün faaliyeti başladıktan sonra, 2.Gelişme döneminde 3.Noksanlık görüldüğünde	3-4 uygulama	75-100 gr/da.	200-250 gr/da.
Pamuk	1.Taraklanma başlangıcında 2. Koza oluşumundan önce	2 uygulama	100 gr/da. 150 gr/da.	200-250 gr/da.
Mısır-Ayçiçeği- Buğday-Arpa-Çeltik	1.Kardeşlenme öncesinde 2.Sapa kalkma döneminde	2 uygulama	100 gr/da. 150 gr/da.	200-250 gr/da.
Patates-Şekerpancarı	Yumru irileşme döneminde	2 uygulama	75-100 gr/da.	200-250 gr/da.
Havuç-Soğan-Sarımsak	Bitkilerin 5-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren	2 uygulama	75-100 gr/da.	200-250 gr/da.
Yeşil alanlar-Kesme çiçekçilik	Gelişme döneminde, demir noksanlığı görüldüğünde	2-5 uygulama	100-150 gr/da	200-250 gr/da.
TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANIMI TAVSİYE EDİLİR.				

Stok, ambalaj, fiyat ve parti özellikleri teklifte teyit edilir. Güncel ürün etiketi ve uygulama talimatlarını esas alın. Ambalaj görselleri temsildir.

İletişim ve sipariş

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727