

NUFERTO Liquid 001



SKU: SRC-78474ADC00BCDE0E

Category: Liquid fertilizers

Formula: Confirm for current batch

Packaging: Confirm for current batch

Price on request[View product online](#)

Description

NUFERTO Liquid 001 - Plant nutrition product. Contact us for packaging options, availability and a quotation. Confirm the current product label, application instructions and batch specification before use.

Technical information

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Suda Çözünür Demir (Fe):	6
Ürün etkinliğini artırmak için katkı maddeleri mevcuttur.	

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN (100 lt su ile)	DAMLA SULAMADAN
SEBZELER; Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasulye, Bezelye, Bamyas, Enginar vb.	Fideler şaşırtıldıktan bir hafta sonra başlayarak meyve olgunlaşana kadar 3-4 uygulama	100-150 cc	250-400 cc/da.
YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER; Marul-Kıvırcık-Lahana, Pırasa, Ispanak vb.	Fide döneminden itibaren 15 gün ara ile sezon boyunca	100-150 cc	350-500 cc/da.
YUMRULU BİTKİLER; Şekerpancarı, Soğan, Sarımsak, Patates. Şalgam, Havuç, vb.	İkinci çapadan sonra 21 gün arayla sezon boyunca uygulanır	150-200 cc	350-500 cc/da.
MEYVE AĞAÇLARI; Elma, Armut, Kaysı, Badem, Erik, Kiraz, Ayva, Şeftali, Nar, İncir, Zeytin vb.	Meyve bağlama, büyütme ve hasat öncesine kadar 2-3 uygulama	150-200 cc	500-600 cc/da. veya 50 cc/ağaç

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN (100 lt su ile)	DAMLA SULAMADAN
Çilek, Ahududu, Yaban Mersini	Çiçek öncesi ve meyve bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.	100-150 cc	250-400 cc/da.
Fındık, Antep fıstığı, Ceviz, Badem	Çiçek öncesi, Meyve tutumu, meyve büyütme ve hasat öncesi 2-3 uygulama	150-200 cc	500-600 cc/da. veya 50 cc/ağaç
Muz	Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır	150-200 cc	500-600 cc/da. veya 50 cc/ağaç
Bağcılık (Üzüm)	Meyve bağlama, büyütme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır	150-200 cc	400-500 cc/da. veya 10 cc/omca
Kavun, Karpuz, Kabak	İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile sezon boyunca uygulanır	150-200 cc	500-600 cc/da.
BAKLAGİLLER; Nohut, Mercimek, Fasulye, Soya fasulyesi, Yer fıstığı	İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır	150-200 cc	500-600 cc/da.
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ; Pamuk, Mısır, Çay, Ayçiçeği, Kanola, Tütün	İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır	150-200 cc	500-600 cc/da.
HUBUBAT, TARLA BİTKİLERİ Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek, Nohut vb.	Yabancı ot ilacı ile ve Kardeşlenme dönemi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	150-200 cc	
YEŞİL ALAN VE YEM BİTKİLERİ; Yonca, Korunga, Fiğ, vb.	Her biçimden 10 gün sonra uygulanır.	150-200 cc	
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Yapraklanma dönemi ve sonrasında sezon boyunca haftalık uygulama yapılır	100-150 cc	250-400 cc/da.

Availability, packaging, prices and batch specifications require quotation confirmation. Follow the current product label and application instructions. Packaging visuals are illustrative.

Contact & orders

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727