

NUFERTO Liquid 001



SKU: SRC-78474ADC00BCDE0E

Kategori: Sıvı gübreler

Formül: Güncel parti için teyit edin

Ambalaj: Güncel parti için teyit edin

Fiyat sorunuz

[Ürünü sitede inceleyin](#)

Açıklama

NUFERTO Liquid 001 - Bitki besleme ürünü. Ambalaj seçenekleri, güncel stok ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin. Kullanımdan önce güncel ürün etiketi, uygulama talimatı ve parti analizini teyit edin.

Teknik bilgiler

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Suda Çözünür Demir (Fe):	6
Ürün etkinliğini artırmak için katkı maddeleri mevcuttur.	

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN (100 lt su ile)	DAMLA SULAMADAN
SEBZELER; Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasulye, Bezelye, Bamyas, Enginar vb.	Fideler şaşırtıldıktan bir hafta sonra başlayarak meyve olgunlaşana kadar 3-4 uygulama	100-150 cc	250-400 cc/da.
YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER; Marul-Kıvırcık-Lahana, Pırasa, Ispanak vb.	Fide döneminden itibaren 15 gün ara ile sezon boyunca	100-150 cc	350-500 cc/da.
YUMRULU BİTKİLER; Şekerpancarı, Soğan, Sarımsak, Patates. Şalgam, Havuç, vb.	İkinci çapadan sonra 21 gün arayla sezon boyunca uygulanır	150-200 cc	350-500 cc/da.
MEYVE AĞAÇLARI; Elma, Armut, Kaysı, Badem, Erik, Kiraz, Ayva, Şeftali, Nar, İncir, Zeytin vb.	Meyve bağlama, büyütme ve hasat öncesine kadar 2-3 uygulama	150-200 cc	500-600 cc/da. veya 50 cc/ağaç

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN (100 lt su ile)	DAMLA SULAMADAN
Çilek, Ahududu, Yaban Mersini	Çiçek öncesi ve meyve bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.	100-150 cc	250-400 cc/da.
Fındık, Antep fıstığı, Ceviz, Badem	Çiçek öncesi, Meyve tutumu, meyve büyütme ve hasat öncesi 2-3 uygulama	150-200 cc	500-600 cc/da. veya 50 cc/ağaç
Muz	Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır	150-200 cc	500-600 cc/da. veya 50 cc/ağaç
Bağcılık (Üzüm)	Meyve bağlama, büyütme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır	150-200 cc	400-500 cc/da. veya 10 cc/omca
Kavun, Karpuz, Kabak	İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile sezon boyunca uygulanır	150-200 cc	500-600 cc/da.
BAKLAGİLLER; Nohut, Mercimek, Fasulye, Soya fasulyesi, Yer fıstığı	İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır	150-200 cc	500-600 cc/da.
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ; Pamuk, Mısır, Çay, Ayçiçeği, Kanola, Tütün	İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır	150-200 cc	500-600 cc/da.
HUBUBAT, TARLA BİTKİLERİ Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek, Nohut vb.	Yabancı ot ilacı ile ve Kardeşlenme dönemi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	150-200 cc	
YEŞİL ALAN VE YEM BİTKİLERİ; Yonca, Korunga, Fiğ, vb.	Her biçimden 10 gün sonra uygulanır.	150-200 cc	
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Yapraklanma dönemi ve sonrasında sezon boyunca haftalık uygulama yapılır	100-150 cc	250-400 cc/da.

Stok, ambalaj, fiyat ve parti özellikleri teklifte teyit edilir. Güncel ürün etiketi ve uygulama talimatlarını esas alın. Ambalaj görselleri temsildir.

İletişim ve sipariş

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727