

NUFERTO Liquid 001



SKU: SRC-78474ADC00BCDE0E

类别: 液体肥料

配方: 请确认当前批次

包装: 请确认当前批次

价格请咨询

[在线查看产品](#)

说明

NUFERTO Liquid 001 - 植物营养产品。请联系我们了解包装、库存和报价。使用前请确认最新产品标签、使用说明及批次分析。

技术资料

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Suda Çözünür Demir (Fe):	6
Ürün etkinliğini artırmak için katkı maddeleri mevcuttur.	

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN (100 lt su ile)	DAMLA SULAMADAN
SEBZELER; Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasulye, Bezelye, Bamya, Enginar vb.	Fideler şaşırtıldıktan bir hafta sonra başlayarak meyve olgunlaşana kadar 3-4 uygulama	100-150 cc	250-400 cc/da.
YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER; Marul- Kıvırcık-Lahana, Pırasa, Ispanak vb.	Fide döneminden itibaren 15 gün ara ile sezon boyunca	100-150 cc	350-500 cc/da.
YUMRULU BİTKİLER; Şekerpancarı, Soğan, Sarımsak, Patates. Şalgam, Havuç, vb.	İkinci çapadan sonra 21 gün aralıklarla sezon boyunca uygulanır	150-200 cc	350-500 cc/da.
MEYVE AĞAÇLARI; Elma, Armut, Kayısı, Badem, Erik, Kiraz, Ayva, Şeftali, Nar, İncir, Zeytin vb.	Meyve bağlama, büyütme ve hasat öncesine kadar 2-3 uygulama	150-200 cc	500-600 cc/da. veya 50 cc/ağaç
Çilek, Ahududu, Yaban Mersini	Çiçek öncesi ve meyve bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.	100-150 cc	250-400 cc/da.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN (100 lt su ile)	DAMLA SULAMADAN
Fındık, Antep fıstığı, Ceviz, Badem	Çiçek öncesi, Meyve tutumu, meyve büyütme ve hasat öncesi 2-3 uygulama	150-200 cc	500-600 cc/da. veya 50 cc/ağaç
Muz	Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır	150-200 cc	500-600 cc/da. veya 50 cc/ağaç
Bağcılık (Üzüm)	Meyve bağlama, büyütme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır	150-200 cc	400-500 cc/da. veya 10 cc/omca
Kavun, Karpuz, Kabak	İkinci çapadan sonra 21 gün arası ile sezon boyunca uygulanır	150-200 cc	500-600 cc/da.
BAKLAGİLLER; Nohut, Mercimek, Fasulye, Soya fasulyesi, Yer fıstığı	İkinci çapadan sonra 21 gün arası ile 2-3 uygulama yapılır	150-200 cc	500-600 cc/da.
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ; Pamuk, Mısır, Çay, Ayçiçeği, Kanola, Tütün	İkinci çapadan sonra 21 gün arası ile 2-3 uygulama yapılır	150-200 cc	500-600 cc/da.
HUBUBAT, TARLA BİTKİLERİ Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek, Nohut vb.	Yabancı ot ilacı ile ve Kardeşlenme dönemi ve sonrası 15 gün arası ile 2-3 uygulama yapılır.	150-200 cc	
YEŞİL ALAN VE YEM BİTKİLERİ; Yonca, Korunga, Fiğ, vb.	Her biçimden 10 gün sonra uygulanır.	150-200 cc	
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Yapraklanma dönemi ve sonrasında sezon boyunca haftalık uygulama yapılır	100-150 cc	250-400 cc/da.

供应、包装、价格和批次规格须在报价中确认。请遵循最新产品标签和使用说明。包装图片仅供示意。

联系与订购

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727