

# NUFERTO Amino 024



SKU: SRC-13F6C2CA35B3F62D

Категория: Аминокислоты

Формула: Уточните для текущей партии

Упаковка: Уточните для текущей партии

## Цена по запросу

[Открыть товар на сайте](#)

## Описание

NUFERTO Amino 024 - Продукт для питания растений. Свяжитесь с нами для уточнения упаковки, наличия и стоимости. Перед применением проверьте актуальную этикетку, инструкцию и анализ партии.

## Технические данные

| ORGANİK AKTİF BİLEŞENLER                                      |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| Çok fonksiyonlu taşıyıcı organik etken maddeler, enzimler vs. |  |
| DİĞER YARDIMCI BİLEŞENLER                                     |  |
| Organik bitki ekstreleri, bitkisel yağlar ve aminoasitler vs. |  |

| BİTKİLER                                                                                                    | UYGULAMA ZAMANI                              | YAPRAKTAN UYGULAMA | TOPRAKTAN   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------|
| (Damlama )                                                                                                  |                                              |                    |             |
| SEBZELER (Sera, örtü altı, Açık tarla) (Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Salatalık, Fasulye, Kavun, Karpuz, | 1. uygulama: Fide dikiminden 10-15 gün sonra |                    | 200 cc /da. |
| 2.uygulama: Yeşil aksam gelişim döneminde                                                                   |                                              | 200 cc /da.        |             |
| 3.uygulama: Meyve irileşme döneminde                                                                        |                                              | 200 cc /da.        |             |
| Yeşil aksam gelişim döneminde                                                                               | 100 cc /100 lt su                            |                    |             |

| BİTKİLER                                                                            | UYGULAMA ZAMANI                       | YAPRAKTAN UYGULAMA | TOPRAKTAN   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|
| Meyve irileşme döneminde                                                            | 100 cc /100 lt su                     |                    |             |
| YUMRULU BİTKİLER (Şeker pancarı, Patates, Soğan, Havuç vb.)                         | Birinci çapa döneminden sonra         | 100 cc /100 lt su  |             |
| Yumru oluşum döneminde                                                              | 100 cc /100 lt su                     |                    |             |
| 6-8 yapraklı dönemde                                                                |                                       | 200 cc /da.        |             |
| YAPRAĞI YENEN BİTKİLER (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Kivırcık, Aysberg, vb.) | Fide dikiminden 10-15 gün sonra       |                    | 200 cc /da. |
| Yeşil aksam gelişim döneminde                                                       |                                       | 200 cc /da.        |             |
| 8-10 Yapraklı dönemde                                                               | 100 cc /100 lt su                     |                    |             |
| Hasattan 15-20 gün önce                                                             | 100 cc /100 lt su                     |                    |             |
| BAKLAGİLLER (Fasulye, Bakla, Nohut, Soya, Mercimek, Bezelye, vb.)                   | Yeşil aksam gelişim döneminde         | 100 cc /100 lt su  | 200 cc /da. |
| Çiçeklenme döneminde                                                                | 100 cc /100 lt su                     |                    |             |
| Kapsül oluşum döneminde                                                             | 100 cc /100 lt su                     |                    |             |
| SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (Zeytin, Kiraz, Vişne, Kayısı, Şeftali, Erik vb.)          | İlk sulama suyu ile birlikte          |                    | 200 cc /da. |
| İç dolum (meyve irileşme) döneminde                                                 |                                       | 200 cc /da.        |             |
| 1.uygulama: Çiçeklenme öncesi                                                       | 100 cc /100 lt su                     |                    |             |
| 2.uygulama: Hasattan 30 gün önce                                                    | 100 cc /100 lt su                     |                    |             |
| YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (Elma, Armut, Ayva, Hurma, İncir, vb.)                  | 1.uygulama: Mart veya Nisan aylarında |                    | 200 cc /da  |
| 2.uygulama: Mayıs veya haziran aylarında                                            |                                       | 200 cc /da         |             |
| 1.uygulama: Yapraklanmanın başlamasıyla birlikte                                    | 100 cc /100 lt su                     |                    |             |

| BİTKİLER                                                                       | UYGULAMA ZAMANI                           | YAPRAKTAN UYGULAMA | TOPRAKTAN   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 2.uygulama: Sürgünler<br>15-20 cm olunca                                       | 100 cc /100 lt su                         |                    |             |
| 3.uygulama: Meyveler<br>küçük fındık büyüklüğünde                              | 100 cc /100 lt su                         |                    |             |
| 4.uygulama: üçüncü<br>uygulamadan 15-20 gün<br>sonra                           | 100 cc /100 lt su                         |                    |             |
| SERT KABUKLU MEYVELER<br>(Antep fıstığı, Fındık,<br>Badem, Ceviz, Kestane vb.) | Mayıs veya haziran ayında<br>(1 ton suya) |                    | 200 cc /da. |
| 1.uygulama: yapraklanma<br>başlangıcında                                       | 100 cc /100 lt su                         |                    |             |
| 2.uygulama: meyveler<br>mercimek büyüklüğünde<br>iken                          | 100 cc /100 lt su                         |                    |             |
| 3.uygulama: ekim ayında                                                        | 100 cc /100 lt su                         |                    |             |
| TARLA BİTKİLERİ (Buğday,<br>Arpa, Çeltik, Yulaf, Çavdar<br>vb.)                | 1.uygulama: Kardeşlenme<br>başlangıcında  | 100 cc /100 lt su  |             |
| 2.uygulama: Birinci<br>uygulamadan 15-20 gün<br>sonra                          | 100 cc /100 lt su                         |                    |             |
| ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Yer<br>fıstığı, Soya, Tütün, Pamuk,<br>Ayçiçeği, vb.)      | 1.uygulama: İlk sulama ile<br>birlikte    |                    | 200 cc /da  |
| 2.uygulama: Bitki boyları<br>15-20 cm'ye geldiğinde                            |                                           | 200 cc /da         |             |
| 1.uygulama: Bitki boyları<br>15-20 cm iken                                     | 100 cc /100 lt su                         |                    |             |
| 2.uygulama: Bitki boyları<br>20-25 cm iken                                     | 100 cc /100 lt su                         |                    |             |
| PAMUK                                                                          | Taraklanma başlangıcında                  |                    | 100 cc /da. |
| Koza dönemi başlangıcında                                                      |                                           | 100 cc /da.        |             |
| MISIR                                                                          | 1.uygulama: 8-10 Yapraklı<br>dönemde      |                    | 200 cc /da. |
| 2.uygulama: Püsküllenme<br>döneminde                                           |                                           | 200 cc /da.        |             |

| BİTKİLER                                                     | UYGULAMA ZAMANI                                    | YAPRAKTAN UYGULAMA | TOPRAKTAN   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1.uygulama: 8-10 Yapraklı dönemde                            | 100 cc /100 lt su                                  |                    |             |
| 2.uygulama: Bitki 50-60 cm boyunda iken                      | 100 cc /100 lt su                                  |                    |             |
| NARENCİYE (Portakal, Limon, Mandarin, Kamkat, Greyfurt, vb.) | 1.uygulama: Mart veya Nisan aylarında              |                    | 200 cc /da  |
| 2.uygulama: Mayıs veya haziran aylarında                     |                                                    | 200 cc /da         |             |
| 1.uygulama: Çiçek öncesi                                     | 100 cc /100 lt su                                  |                    |             |
| 2.uygulama: Çiçek dökümünden sonra                           | 100 cc /100 lt su                                  |                    |             |
| 3.uygulama: meyveler fındık iriliğine gelince                | 100 cc /100 lt su                                  |                    |             |
| 4.uygulama: meyveler ceviz iriliğine gelince                 | 100 cc /100 lt su                                  |                    |             |
| ÇİLEK                                                        | 1.uygulama: Dikimden sonra ilk sulama ile birlikte |                    | 200 cc /da. |
| 2.uygulama: Birinci uygulamadan 15-20 gün sonra              |                                                    | 200 cc /da         |             |
| 3.uygulama: İkinci uygulamadan 15-20 gün sonra               |                                                    | 200 cc /da         |             |
| 1.uygulama: Dikimden 10-15 gün sonra                         | 100 cc /100 lt su                                  |                    |             |
| 2.uygulama: Birinci uygulamadan 15-20 gün sonra              | 100 cc /100 lt su                                  |                    |             |
| 3.uygulama: ikinci uygulamadan 15-20 gün sonra               | 100 cc /100 lt su                                  |                    |             |
| MUZ                                                          | 1. Çiçeklenme öncesi dönem                         |                    | 200 cc /da. |
| 2. Birinci uygulamadan 30 gün sonra                          |                                                    | 200 cc /da.        |             |
| 3. İkinci uygulamadan 30 gün sonra                           |                                                    | 200 cc /da.        |             |

| BİTKİLER                                         | UYGULAMA ZAMANI                                                                                       | YAPRAKTAN UYGULAMA | TOPRAKTAN   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| BAĞ                                              | 1.uygulama: Mart veya Nisan aylarında                                                                 |                    | 200 cc /da  |
| 2.uygulama: Mayıs veya haziran aylarında         |                                                                                                       | 200 cc /da         |             |
| 1.uygulama: Yapraklanmanın başlamasıyla birlikte | 100 cc /100 lt su                                                                                     |                    |             |
| 2.uygulama: Sürgünler 15-20 cm olunca            | 100 cc /100 lt su                                                                                     |                    |             |
| 3.uygulama: İnce koruk döneminde                 | 100 cc /100 lt su                                                                                     |                    |             |
| 4.uygulama: Üçüncü uygulamadan 15-20 gün sonra   | 100 cc /100 lt su                                                                                     |                    |             |
| ÇAY                                              | Nisan veya mayıs aylarında Nisan, mayıs aylarından başlayarak sezon boyunca her 15 günde bir uygulama | 100 cc /100 lt su  | 200 cc /da. |
| KESME ÇİÇEK & SÜS BİTKİLERİ                      | Dikiminden itibaren 15 gün ara ile hasat sonuna kadar 2 uygulama yapılır.                             | 100 cc/100 lt su   | 200 cc /da  |

Наличие, упаковка, цены и характеристики партии подтверждаются в предложении. Соблюдайте актуальную этикетку и инструкцию. Изображения упаковки являются иллюстративными.

## Контакты и заказ

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727