

NUFERTO Amino 024



SKU: SRC-13F6C2CA35B3F62D

类别: 氨基酸

配方: 请确认当前批次

包装: 请确认当前批次

价格请咨询

[在线查看产品](#)

说明

NUFERTO Amino 024 - 植物营养产品。请联系我们了解包装、库存和报价。使用前请确认最新产品标签、使用说明及批次分析。

技术资料

ORGANİK AKTİF BİLEŞENLER	
Çok fonksiyonlu taşıyıcı organik etken maddeler, enzimler vs.	
DİĞER YARDIMCI BİLEŞENLER	
Organik bitki ekstraktları, bitkisel yağlar ve aminoasitler vs.	

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN
(Damlama)			
SEBZELER (Sera, örtü altı, Açık tarla) (Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Salatalık, Fasulye, Karpuz,	1. uygulama: Fide dikiminden 10-15 gün sonra		200 cc /da.
2.uygulama: Yeşil aksam gelişim döneminde		200 cc /da.	
3.uygulama: Meyve irileşme döneminde		200 cc /da.	
Yeşil aksam gelişim döneminde	100 cc /100 lt su		
Meyve irileşme döneminde	100 cc /100 lt su		

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN
YUMRULU BİTKİLER (Şeker pancarı, Patates, Soğan, Havuç vb.)	Birinci çapa döneminden sonra	100 cc /100 lt su	
Yumru oluşum döneminde	100 cc /100 lt su		
6-8 yapraklı dönemde		200 cc /da.	
YAPRAĞI YENEN BİTKİLER (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Kivircik, Aysberg, vb.)	Fide dikiminden 10-15 gün sonra		200 cc /da.
Yeşil aksam gelişim döneminde		200 cc /da.	
8-10 Yapraklı dönemde	100 cc /100 lt su		
Hasattan 15-20 gün önce	100 cc /100 lt su		
BAKLAGİLLER (Fasulye, Bakla, Nohut, Soya, Mercimek, Bezelye, vb.)	Yeşil aksam gelişim döneminde	100 cc /100 lt su	200 cc /da.
Çiçeklenme döneminde	100 cc /100 lt su		
Kapsül oluşum döneminde	100 cc /100 lt su		
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (Zeytin, Kiraz, Vişne, Kayısı, Şeftali, Erik vb.)	İlk sulama suyu ile birlikte		200 cc /da.
İç dolum (meyve irileşme) döneminde		200 cc /da.	
1.uygulama: Çiçeklenme öncesi	100 cc /100 lt su		
2.uygulama: Hasattan 30 gün önce	100 cc /100 lt su		
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (Elma, Armut, Ayva, Hurma, İncir, vb.)	1.uygulama: Mart veya Nisan aylarında		200 cc /da
2.uygulama: Mayıs veya haziran aylarında		200 cc /da	
1.uygulama: Yapraklanmanın başlamasıyla birlikte	100 cc /100 lt su		
2.uygulama: Sürgünler 15-20 cm olunca	100 cc /100 lt su		
3.uygulama: Meyveler küçük fındık büyüklüğünde	100 cc /100 lt su		

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN
4.uygulama: üçüncü uygulamadan 15-20 gün sonra	100 cc /100 lt su		
SERT KABUKLU MEYVELER (Antep fıstığı, Fındık, Badem, Ceviz, Kestane vb.)	Mayıs veya haziran ayında (1 ton suya)		200 cc /da.
1.uygulama: yapraklanma başlangıcında	100 cc /100 lt su		
2.uygulama: meyveler mercimek büyüklüğünde iken	100 cc /100 lt su		
3.uygulama: ekim ayında	100 cc /100 lt su		
TARLA BİTKİLERİ (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf, Çavdar vb.)	1.uygulama: Kardeşlenme başlangıcında	100 cc /100 lt su	
2.uygulama: Birinci uygulamadan 15-20 gün sonra	100 cc /100 lt su		
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Yer fıstığı, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, vb.)	1.uygulama: İlk sulama ile birlikte		200 cc /da
2.uygulama: Bitki boyları 15-20 cm'ye geldiğinde		200 cc /da	
1.uygulama: Bitki boyları 15-20 cm iken	100 cc /100 lt su		
2.uygulama: Bitki boyları 20-25 cm iken	100 cc /100 lt su		
PAMUK	Taraklanma başlangıcında		100 cc /da.
Koza dönemi başlangıcında		100 cc /da.	
MISIR	1.uygulama: 8-10 Yapraklı dönemde		200 cc /da.
2.uygulama: Püsküllenme döneminde		200 cc /da.	
1.uygulama: 8-10 Yapraklı dönemde	100 cc /100 lt su		
2.uygulama: Bitki 50-60 cm boyunda iken	100 cc /100 lt su		
NARENCİYE (Portakal, Limon, Mandarin, Kamkat, Greyfurt, vb.)	1.uygulama: Mart veya Nisan aylarında		200 cc /da

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN
2.uygulama: Mayıs veya haziran aylarında		200 cc /da	
1.uygulama: Çiçek öncesi	100 cc /100 lt su		
2.uygulama: Çiçek dökümünde sonra	100 cc /100 lt su		
3.uygulama: meyveler fındık iriliğine gelince	100 cc /100 lt su		
4.uygulama: meyveler ceviz iriliğine gelince	100 cc /100 lt su		
ÇİLEK	1.uygulama: Dikimden sonra ilk sulama ile birlikte		200 cc /da.
2.uygulama: Birinci uygulamadan 15-20 gün sonra		200 cc /da	
3.uygulama: İkinci uygulamadan 15-20 gün sonra		200 cc /da	
1.uygulama: Dikimden 10-15 gün sonra	100 cc /100 lt su		
2.uygulama: Birinci uygulamadan 15-20 gün sonra	100 cc /100 lt su		
3.uygulama: ikinci uygulamadan 15-20 gün sonra	100 cc /100 lt su		
MUZ	1. Çiçeklenme öncesi dönem		200 cc /da.
2. Birinci uygulamadan 30 gün sonra		200 cc /da.	
3. İkinci uygulamadan 30 gün sonra		200 cc /da.	
BAĞ	1.uygulama: Mart veya Nisan aylarında		200 cc /da
2.uygulama: Mayıs veya haziran aylarında		200 cc /da	
1.uygulama: Yapraklanmanın başlamasıyla birlikte	100 cc /100 lt su		
2.uygulama: Sürgünler 15-20 cm olunca	100 cc /100 lt su		
3.uygulama: İnce koruk döneminde	100 cc /100 lt su		

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN
4.uygulama: üçüncü uygulamadan 15-20 gün sonra	100 cc /100 lt su		
ÇAY	Nisan veya mayıs aylarında Nisan, mayıs aylarından başlayarak sezon boyunca her 15 günde bir uygulama	100 cc /100 lt su	200 cc /da.
KESME ÇİÇEK & SÜS BİTKİLERİ	Dikiminden itibaren 15 gün aralı ile hasat sonuna kadar 2 uygulama yapılır.	100 cc/100 lt su	200 cc /da

供应、包装、价格和批次规格须在报价中确认。请遵循最新产品标签和使用说明。 包装图片仅供示意。

联系与订购

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727