

NUFERTO NPK 057



SKU: SRC-38FEB97310205ECC

Categoría: Fertilizantes compuestos

Fórmula: Confirmar para el lote actual

Envase: Confirmar para el lote actual

Consultar precio

[Ver producto en línea](#)

Descripción

NUFERTO NPK 057 - Producto de nutrición vegetal. Contacte con nosotros para consultar envases, disponibilidad y presupuesto. Confirme la etiqueta actual, las instrucciones y el análisis del lote antes de usar.

Datos técnicos

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Toplam Azot (N)	9
Amonyum Azotu (NH ₄ -N):	4
Nitrat Azotu (NO ₃ -N):	2
Üre Azotu (Nh ₂ -N):	3
Suda çözünür fosfor penta oksit (P ₂ O ₅):	18
Suda çözünür potasyum oksit (K ₂ O):	10
Suda çözünür Magnezyum oksit (MgO):	2
Suda çözünür Bor (B):	1
Suda çözünür Demir (Fe):	3
Suda çözünür Mangan (Mn):	1
Suda çözünür Molibden (Mo):	0,04
Suda çözünür Çinko (Zn):	2
Ürün etkinliğini artırmak için katkı maddeleri mevcuttur.	

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLAMADAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi Çiçekler %80 açtıktan sonra Meyve tutumu sonrası Hasat sonu gübrelemesi	100-150 g/ 100 L su 150-200 g / 100 L su 150-200 g / 100 L su 100-150 g / 100 L su	0.5-1 kg/ da (20-25 ağaç için)
MEYVE AĞAÇLARI	Çiçeklenme öncesi Çiçekler %80 açtıktan sonra Meyve tutumu sonrası Hasat sonu gübrelemesi	100-150 g/ 100 L su 150-200 g / 100 L su 150-200 g / 100 L su 100-150 g / 100 L su	0.5-1 kg/ da (20-25 ağaç için)
MUZ	Doğum öncesi dönemde Doğum sonrası dönemde	200 g/100 L su 250 g/100 L su (yağmurlama sistemi)	
BAĞLAR	Çiçek tutumundan önce Meyve tutumunda Hasattan 1 ay önce	50-75 g / 100 L su 50-75 g / 100 L su 50-75 g/ 100 L su	0.5-1 kg/ da
ANTEP FISTIĞI	Yaprak oluşumundan sonra Taneler buğday iriliğinde iken Hasat sonu gübrelemesi	75-100 g / 100 L su 75-100 g / 100 L su 75-100 g / 100 L su	1 kg/ da (20-25 ağaç için)
MISIR, AYÇİÇEĞİ	Bitki boyu 45 cm olduğunda (Traktörün son giriminde)	75-100 g / da	
PAMUK	Çiçek öncesi Taraklanma başlangıcı Hasattan 45 gün önce	75-100 g / da 75-100 g / da 75-100 g / da	
ZEYTİN	Çiçeklenme döneminde Nohut iriliğindeyken Hasattan 45 gün önce	50-75 g/100 L su 50-75 g/100 L su 50-75 g/100 L su	1 kg/ da (20-25 ağaç için)
LAHANA, KARNABAHAAR, BEZELYE, FASULYE	2 uygulama: 4-6 yapraklı dönemde ve 20 gün sonra 2. uygulama	50-75 g/ 100 L su	1 kg/ da.
ŞEKERPANCARI	1.çapadan sonra 2.çapadan sonra	100-150 g/da	
SOĞAN, SARMISAK	Çapalama döneminde 4-6 yapraklı dönem Fındık ve ceviz büyüklüğü döneminde	100 g/ 100 L su 100 g/ 100 L su 150 g /100 L su	1 kg/ da.
HUBUBAT (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Çeltik, Nohut, Mercimek)	1. uygulama: bitki 10 cm olduğunda 2. uygulama: bitki 30-40 cm olduğunda	50-100 g/ da 50-100 g/ da	
SEBZELER (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, kabak v.s)	Tüm sezon boyunca 20 gün ara ile uygulanabilir	100-200 g / 100 L su	0.5-1 kg / da.

Disponibilidad, envases, precios y especificaciones se confirman en la oferta. Siga la etiqueta y las instrucciones vigentes.

Las imágenes del envase son ilustrativas.

Contacto y pedidos

Türkiye: Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya

Oman: North Al Hayl, Al Seeb, Muscat - P.O. Box 111, P.C. 211

WhatsApp: +90 532 551 89 99

Oman: +965 9887 1727